

Thiocodin syrop, 100 ml



Nasza cena: 10,69 zł

Opis słownikowy

Dawka	(15MGG+300G)/10ML
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	100ml
Producent	UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CODEINUM, SULFOGAIACOLUM

Opis produktu

Opis

Syrop Thiocodin w postaci syropu zawiera dwie substancje czynne: kodeiny fosforan półwodny i sulfogwajakol. Stosuje się go w leczeniu suchego, uporczywego kaszlu, bez odrzuszania wydzieliny.

Dawkowanie - Thiocodin syrop, 100 ml

Doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: zazwyczaj stosowana dawka leku to 10 ml syropu (1 miarka) trzy razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin.

Składniki - Thiocodin syrop, 100 ml

10 ml syropu zawiera:

substancje czynne:

- kodeiny fosforan półwodny 15 mg
- sulfogwajakol 300 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, glicerol, sodu benzoesan, aromat truskawkowy, kwas cytrynowy jednowodny, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Działania

Kodeiny fosforan półwodny działa przeciwkaszlowo, hamuje odruch kaszlowy zmniejszając częstość napadów kaszlu.

Sulfogwajakol działa wykrztuśnie, ułatwia przemieszczanie się upłynnionej wydzieliny w drogach oddechowych i jej odrzuszanie.

Wskazania - Thiocodin syrop, 100 ml

Leczenie suchego, uporczywego kaszlu, bez odkrztuszania wydzieliny.

Przeciwwskazania - Thiocodin syrop, 100 ml

- Nie stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie stosować leku jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa.
- Nie stosować leku jeśli u pacjenta występuje niewydolność oddechowa.
- Nie stosować leku jeśli pacjent jest w stanie śpiączki.
- Nie stosować leku jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.
- Nie stosować leku jeśli u pacjenta występują rozstrzenie oskrzeli.
- Nie stosować leku jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu, opioidów.
- Nie stosować leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Nie stosować leku jeśli pacjent odkrztusza wydzielinę.
- Nie stosować leku stosuje aktualnie inhibitory MAO lub stosował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni.

Przeciwwskazania - Thiocodin syrop, 100 ml

Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi są nudności, wymioty, zaparcia, zawroty głowy, uspokojenie. Do rzadziej występujących działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości, euforia, zaburzenia nastroju, zwężenie źrenic, zatrzymanie moczu, senność, skurcz oskrzeli, zaburzenia oddychania, zaostrzenie objawów astmy, ostry ból brzucha, kołatanie serca, spadek ciśnienia i omdlenia, bóle głowy, zmniejszenie apetytu, nadmierna potliwość, bóle żołądka (po zażyciu dużych dawek leku). Ponadto kodeina może również powodować wystąpienie omamów, zaburzeń wzroku i słuchu. Sulfogwajakol w dużych dawkach może powodować podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Uwaga! Nadużywanie produktów leczniczych zawierających kodeinę (stosowanie dłuższe niż zalecane i/lub w dawkach większych niż zalecane) może prowadzić do fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia. Po nagłym zakończeniu leczenia mogą wystąpić

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie na fosforan kodeiny, sulfogwajakol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, zaburzenia czynności układu oddechowego, astmę oskrzelową, mukowiscydozę, choroby oskrzeli, chorobę alkoholową, zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby naczyń obwodowych, niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy, jaskrę, zapalne lub prowadzące do niedrożności choroby jelit, choroby dróg żółciowych, w tym kamicy żółciową, przebyte zabiegi chirurgiczne w obrębie dróg żółciowych, rozrost gruczołu krokowego, kamicy moczową, nietolerancję niektórych cukrów (lek zawiera sacharozę). Gdy przyjmujesz leki przeciwłękowe, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe, nasenne, cytostatyki, opioidowe leki przeciwbólowe, leki rozluźniające mięśnie szkieletowe, klonidynę, metoklopramid, leki stosowane w chorobie Parkinsona, ryfamicynę. Uwaga! Leku Thiocodin nie należy stosować jednocześnie z lekami zaliczanymi do inhibitorów monoaminooksydazy oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.