

## Thiocodin, tabletki, 10 szt.



Nasza cena: 8,20 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,015G+0,3G
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CODEINUM, SULFOGAIACOLUM

### Opis produktu

#### Opis

Preparat stosowany w leczeniu suchego, uporczywego kaszlu.

#### Dawkowanie - Thiocodin, tabletki, 10 szt.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Jedna tabletki 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza.

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

#### Składniki - Thiocodin, tabletki, 10 szt.

Jedna tabletki zawiera:

Substancje czynne: kodeiny fosforan półwodny, sulfogwajakol 300 mg.

Substancje pomocnicze: talk, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

#### Działania

Thiocodin jest lekiem złożonym. Zawiera jako substancje czynne:

kodeiny fosforan półwodny jest lekiem przeciwkaszlowym, hamuje odruch kaszlowy zmniejszając napady kaszlu. Działanie przeciwkaszlowe utrzymuje się do 4-8 godzin

sulfogwajakol jest lekiem wykrztuśnym, zwiększa wydzielanie gruczołów oskrzelowych poprzez drażnienie błony śluzowej żołądka (działanie pośrednie) i oskrzeli (działanie bezpośrednie). Sulfogwajakol ułatwia przemieszczanie upłynnionej wydzieliny w drogach oddechowych i jej odkrztuszenie.

## Przeciwwskazania - Thiocodin, tabletki, 10 szt.

Nie należy stosować leku Thiocodin w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku
- astmy oskrzelowej
- niewydolności oddechowej lub u pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki
- mukowiscydozy
- rozstrzeni oskrzeli
- choroby alkoholowej
- uzależnienia od opioidów

Nie należy stosować leku jednocześnie z inhibitorami monoaminoooksydazy oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu.

Nie należy podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Kodeina hamuje odruch kaszlowy, dlatego nie należy stosować leku u pacjentów odkrztuszających wydzielinę.

## Przeciwwskazania - Thiocodin, tabletki, 10 szt.

Najczęściej występujące działania niepożądane to: nudności i wymioty, zaparcia, zawroty głowy, uspokojenie.

Rzadziej występujące działania niepożądane:

- reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, wysypka, wypryski skórne)
- euforia, zaburzenia nastroju
- zahamowanie ośrodka oddechowego, zmniejszenie częstości oddechu, spłylenie oddechu
- skurcze oskrzeli
- kołatanie serca
- spadek ciśnienia tętniczego i omdlenia
- senność
- zwężenie źrenic
- zatrzymanie moczu
- bóle głowy
- ostry ból brzucha z cechami bólu charakterystycznego dla schorzeń dróg żółciowych lub trzustki, dotyczy to głównie pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego
- zmniejszenie łaknienia
- nadmierna potliwość.

Kodeina może powodować wystąpienie omamów, zaburzeń wzroku i słuchu. Nadużywanie leków zawierających kodeinę wiąże się z ryzykiem uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu podawania leku.

Sulfogwajakol w dużych dawkach może powodować podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

## Uwagi

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Thiocodin:

Lek zawiera kodeinę. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane równocześnie leki nie zawierają kodeiny. Szczególnej ostrożności wymaga stosowanie leku u pacjentów:

- z zaburzeniami czynności układu oddechowego
- ze zmniejszoną objętością krwi
- ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub urazami głowy
- z niewydolnością nerek lub z zaburzeniami czynności wątroby
- z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobą naczyń obwodowych, niedoczynnością tarczycy, niedoczynnością kory nadnerczy lub jaskrą
- z zapalnymi lub prowadzącymi do niedrożności jelit
- z chorobami dróg żółciowych, w tym kamicą żółciową
- po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg żółciowych
- z rozrostem gruczołu krokowego i utrudnionym odpływem moczu
- z kamicą moczową

Lek Thiocodin należy stosować z ostrożnością u osób w podeszłym wieku, ponieważ u tych osób ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest zwiększone. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć stosując lek Thiocodin w najmniejszych skutecznych dawkach możliwie najkrócej.

Równoczesne stosowanie leku Thiocodin z innymi lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego nasila ich działanie.

Dlatego Thiocodin należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy.

Podczas stosowania leku Thiocodin nie należy pić alkoholu, ani zażywać leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn i urządzeń będących w ruchu. Lek może powodować zawroty głowy i senność, co może zakłócać sprawność psychomotoryczną wydłużając czas reakcji.

Podmiot odpowiedzialny

Unia Spółdzielnia Pracy

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**