

Tialorid 50 tabletek

Nasza cena: 2,72 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	AMILORIDUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest zalecany do stosowania w leczeniu:

- nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego,
- zastoinowej niewydolności krążenia,
- marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

Dawkowanie:

Produkt powinien być stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza oraz według jego zaleceń. Zazwyczaj stosuje się następującą dawkę leku:

Początkowa dawka powinna wynosić 0,5 tabletki na dobę. Jeżeli występuje taka potrzeba dawkę można zwiększyć do 1 tabletki na dobę. Tabletkę można podawać w jednej dawce lub też w dwóch podzielonych.

Aby poznać inne sposoby stosowania leku należy zaczerpnąć informacji w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Działanie:

- zwiększa wchłanianie zwrotne wapnia i zmniejsza jego wydalanie z moczem,
- zwiększa wydalanie jonów magnezowych,
- hamuje wydalanie kwasu moczowego,

- obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Skład:

1 tabletkę zawiera 5 mg chlorowodoru amilorydu lub 50 mg hydrochlorotiazynu.

Przeciwwskazania:

Istnieją różnego rodzaju przeciwwskazania do stosowania leku, należą do nich:

- nadwrażliwość na amiloryd, hydrochlorotiazyn oraz inne sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- hiperkaliemia,
- podwyższony poziom wapnia w surowicy,
- stężenie mocznika we krwi powyżej 10 mmol/l, kreatyniny powyżej 130 μmol/l,
- leczenie preparatami litu,
- leczenie innymi lekami oszczędzającymi potas,
- stosowanie leków uzupełniających potas lub dieta bogata w potas,
- ciężka niewydolność wątroby,
- stan przedśpiączkowy w marskości wątroby,
- ciężka niewydolność nerek,
- bezmocz,
- nefropatia cukrzycowa,
- cukrzyca,
- choroba Addisona,
- laktacja.

Działania niepożądane:

- brak łaknienia,
- zaburzenie smaku,
- nudności,
- wymioty,
- biegunka,
- zaparcia,
- zawroty głowy,
- bóle głowy,

- parestezje,
- bezsenność,
- nerwowość,
- zaburzenia pamięci,
- zaburzenia w oddawaniu moczu,
- oddawanie moczu w nocy,
- nietrzymanie moczu,
- świąd,
- wysypka,
- bóle w klatce piersiowej
- bóle pleców.

W celu zapoznania się z innymi działaniami niepożądanymi jakie mogą występować podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub też zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.