

Tiorfan, 100 mg, kapsułki, 10 szt.

Nasza cena: 39,88 zł



Opis słownikowy

Dawka	100MG
Opakowanie	*10
Postać	KAPS.
Producent	Bioprojet Europe Ltd Irlandia [Ie]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	RACECADOTRILUM

Opis produktu

Opis

Tiorfan, 100 mg, kapsułki, twarde

Dawkowanie - Tiorfan, 100 mg, kapsułki, 10 szt.

Podanie doustne.

Dorośli

Początkowo jedna kapsułka, niezależnie od pory dnia. Następnie jedna kapsułka trzy razy dziennie najlepiej przed głównymi posiłkami. Leczenie należy kontynuować do czasu oddania dwóch normalnych stolców.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Nie zaleca się długotrwałego leczenia racekadotrylem.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci: dla niemowląt, dzieci i młodzieży produkt jest dostępny w innych postaciach.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz rozdział 5.2).

Zaleca się ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Składniki - Tiorfan, 100 mg, kapsułki, 10 szt.

Każda kapsułka zawiera 100 mg racekadotrylu (Racecadotrilum).

Substancje pomocnicze: każda kapsułka zawiera 41 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania - Tiorfan, 100 mg, kapsułki, 10 szt.

Tiorfan jest wskazany w leczeniu objawowym ostrej biegunki u dorosłych, gdy nie jest możliwe leczenie przyczynowe.
Jeśli może być zastosowane leczenie przyczynowe racekadotrylu można podawać jako leczenie wspomagające.

Przeciwwskazania - Tiorfan, 100 mg, kaspułki, 10 szt.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Działania niepożądane

Dostępne są dane z badań klinicznych przeprowadzonych u 2193 dorosłych pacjentów cierpiących na ciężką biegunkę leczonych racekadotrylem i 282 w grupie przyjmującej placebo.
Poniższe działania niepożądane występowały w badaniach klinicznych częściej w czasie leczenia racekadotrylem niż przy podawaniu placebo lub były zgłaszane po wprowadzeniu produktu na rynek. Częstość występowania działań niepożądanych została przedstawiona według układu: bardzo często ($\geq 1/10$), często ($\geq 1/100$ do $< 1/10$), niezbyt często ($\geq 1/1\ 000$ do $< 1/100$), rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do $< 1/1\ 000$), bardzo rzadko ($< 1/10\ 000$), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Interakcje

Dotychczas u ludzi nie opisano żadnych interakcji tego produktu z innymi lekami.
U ludzi równoczesne leczenie racekadotrylem i loperamidem lub nifuroksazydem nie zmienia kinetyki racekadotrylu.

Uwagi

Płodność

Badania dotyczące wpływu na płodność przeprowadzone u szczurów nie wykazały takiego działania.

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania racekadotrylu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie ani pośrednie szkodliwe działanie na ciążę, płodność, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój pourodzeniowy. Jednak, ponieważ specyficzne badania kliniczne nie są dostępne, nie należy stosować racekadotrylu u kobiet w ciąży.

Laktacja

Z powodu braku danych dotyczących przenikania racekadotrylu do mleka ludzkiego, produktu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.