

# Toramide 10 mg 30 tabletek

Nasza cena: 28,05 zł

## Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TORASEMIDUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Zaleca się stosowanie leku u pacjentów u których występują dolegliwości takie jak:

- nadciśnienie tętnicze pierwotne,
- obrzęki pochodzenia wątrobowego i nerkowego,
- obrzęki związane z zastoinową niewydolnością serca,
- obrzęk płuc.

### Dawkowanie:

Zaleca się stosowanie leku u osób dorosłych:

W nadciśnieniu tętniczym pierwotnym zalecana dawka do spożycia wynosi 2,5 mg doustnie raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 5 mg raz na dobę. Jednakże zwiększenie dawki powyżej 5mg na dobę nie wnosi nic do leczenia, ponieważ nie obniża to ciśnienia tętniczego. Efekt leczenia widać po stosowaniu leku przez okres 12 tygodni.

W obrzęku zazwyczaj stosuje się dawkę 5 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększać stopniowo do dawki 20 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach, pod ścisłą kontrolą lekarza można podawać dawkę do 40 mg/dobę.

### Działanie:

Torasemid jest lekiem moczopędnym pętlowym. Jednak przy małych dawkach jego profil farmakodynamiczny przypomina leki moczopędne tiazydowe pod względem natężenia i czasu trwania diurezy. W większych dawkach torasemid przyspiesza diurezę w sposób zależny od dawki, przy czym działanie to może być bardzo nasilone.

## Skład:

1 tabletkę zawiera 10 mg torasemidu.

## Przeciwwskazania:

### Nie zaleca się stosowania leku jeżeli u pacjentów wystąpiła:

- nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonilomocznika lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- niewydolność nerek z anurią,
- śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy,
- niskie ciśnienie tętnicze,
- okres ciąży i laktacji,
- zaburzenia rytmu serca,
- niewydolność nerek po zastosowaniu innych leków powodujących uszkodzenie nerek.

Nie należy również stosować leku jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi czy cefalosporynami

## Działania niepożądane:

- powikłania zakrzepowo-zatorowe,
- zaburzenia krążenia związane z zagęszczeniem krwi,
- zaburzenia wzroku,
- szum w uszach,
- zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych,
- świąd,
- wysypka,
- nadwrażliwość na światło,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- niskie ciśnienie tętnicze,
- uczucie osłabienia,
- senność,
- stan splątania,

- utrata apetytu,

- skurcze.

W celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących działań niepożądanych podczas stosowania leku należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.