

Transtec 35 µg/H 20 mg 5 plastrów

Nasza cena: 7,45 zł

Opis słownikowy

Dawka	35MCG/H 20MG
Opakowanie	*5
Postać	PLASTER
Producent	GRUNENTHAL GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	BUPRENORPHINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu:

- bólu o średnim i dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych,
- bólu o dużym nasileniu w przebiegu innych schorzeń.

Należy zauważyć, że lek nie jest lekiem odpowiednim do leczenia ostrego bólu.

Dawkowanie:

Ze względu na silne działanie leku, należy stosować go pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego i według jego zaleceń. Dawkowanie zależy od osobniczej wrażliwości pacjenta (nasilenia dolegliwości bólowych, odczuwania bólu, indywidualnych reakcji). Na początku leczenia należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę leku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

Działanie:

Lek wykazuje silne działanie przeciwbólowe.

Skład:

Pojedynczy system transdermalny zawiera 20 mg buprenorfiny i uwalnia 35 µg/h buprenorfiny w ciągu 96 h.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- stosowanie w celu leczenia pacjentów uzależnionych od opioidów i zespołu abstynencyjnego,
- istniejąca lub zagrażająca niewydolność ośrodka oddechowego,
- u pacjentów leczonych inhibitorami MAO,
- ciąża.

Działania niepożądane:

Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

- nudności,
- wymioty,
- rumień,
- świąd,
- zawroty, bóle głowy,
- duszność,
- zaparcia,
- wysypka,
- obfite pocenie,
- obrzęki,
- uczucie zmęczenia.

Należy zauważyć iż działania niepożądane mogą objawiać się w różny sposób w zależności od pacjenta. Mogą one również w ogóle się nie pojawiać. Jeżeli jednak u pacjenta wystąpią którekolwiek z działań niepożądanych należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Więcej informacji na temat działań niepożądanych zostało zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.