

Traumon, żel 10% 50g



Nasza cena: 28,31 zł

Opis słownikowy

Dawka	10%
Opakowanie	50 g
Postać	ZEL
Producent	MEDA AB SZWECJA [SE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ETOFENAMATUM

Opis produktu

Opis

Traumon jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Dawkowanie - Traumon, żel 10% 50g

Jeśli lekarz nie zaleci, należy nałożyć pasek długości 5 do 10 cm leku Traumon żel na skórę w okolicy objętej bólem, pokrywając nim powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem i wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się leku.

Powtarzać 3 do 4 razy na dobę.

Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3 do 4 tygodni, zaś tępych urazów (np. urazów sportowych)- do 2 tygodni.

Składniki - Traumon, żel 10% 50g

Substancją czynną leku jest etofenamat.

Inne składniki leku: karbomer 940, eter makrogolu oleinocetylowy, sodu wodorotlenek, alkohol izopropylowy, maktogol 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Działania

Etofenamat - substancja czynna leku Traumon działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Etofenamat należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo wchłania się przez skórę i gromadzi w zmienionych zapalnie tkankach.

Stosowanie na skórę ogranicza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych typowych dla NLPZ podawanych doustnie. Traumon nie pozostawia na skórze tłustej warstwy.

Wskazania - Traumon, żel 10% 50g

- tępe urazy takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów,
- choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych,
- reumatyzm pozastawowy (ból okolicy krzyżowo-łędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych),
- zapalenie nadkłytki.

Przeciwwskazania - Traumon, żel 10% 50g

Kiedy nie stosować leku Traumon:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku
- u kobiet w ciąży
- u dzieci

Przeciwwskazania - Traumon, żel 10% 50g

- jak każdy lek, Traumon może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. rzadko występujące działanie niepożądane (częstość od 1 na 1000 do 1 na 10000 osób) - zaczerwienienie skóry,
- bardzo rzadko występujące działanie niepożądane (częstość mniejsza niż 1 na 10000 osób) - skórne reakcje alergiczne np. silny świąd, wysypka, rumień, obrzęk, pęcherze.

Wszystkie działania niepożądane przemijają zazwyczaj po odstawieniu leku. Ze względu na obecność glikolu propylenowego może powodować podrażnienie skóry. Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Uwagi

Nie należy stosować u kobiet w ciąży. W okresie karmienia piersią w razie konieczności można zastosować lek krótkotrwale i na małej powierzchni skóry.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.