

Triacyt MR 60 tabletek

Nasza cena: 28,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TRIMETAZIDINUM

Opis produktu

Opis

Skład leku

Substancję czynną leku Triacyt MR stanowi dichlorowodorek trimetazydyny.

Postać leku, warunki przechowywania oraz szczególne środki ostrożności

W opakowaniu znajdują się okrągłe, białe tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, pakowane w blistry umieszczone w tekturowym pudełku. Lek należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej i poza zasięgiem dzieci.

Bezwzględnie należy przestrzegać daty ważności podanej na opakowaniu, ponieważ po jej upływie lek nie nadaje się do spożycia. Co istotne, wyrobów medycznych i farmaceutycznych nie powinno się wyrzucać do przydomowych pojemników na śmieci lub do kanalizacji – przeterminowane leki najlepiej odnieść do apteki, gdzie uzyskamy informację o ich prawidłowym usunięciu.

Wskazania - Triacyt MR 60 tabletek i działanie

Triacyt MR znajduje zastosowanie w skojarzonej terapii schorzeń:

- kardiologicznych – choroba niedokrwienna serca (przyjmowanie leku pozwala ograniczyć bóle dławicowe oraz zwiększyć odporność na wysiłek fizyczny u osób, które źle tolerują leczenie pierwszego rzutu przewidziane w terapii przeciwdławicowej lub w przypadkach gdy dotychczasowa farmakoterapia okazała się niedostatecznie skuteczna);
- otolaryngologicznych – zaburzenia wywołane niedokrwieniem, objawiające się m.in. niedosłuchem, szumami usznymi czy zawrotami głowy.

Lek powinien być stosowany u osób dorosłych, w skojarzeniu z innymi preparatami i wyłącznie po wcześniejszym zasięgnięciu opinii lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przyjmowaniem leku i jego zbyt mocnym lub słabym działaniem wskazana jest konsultacja lekarska.

Tabletki wchłaniają się z przewodu pokarmowego, co następuje dość szybko po doustnym zażyciu tabletki. Stężenie maksymalne zostaje osiągnięte po ok. 5 godzinach, a okres półtrwania utrzymuje się na poziomie ok. 7 godzin (u osób po 65. roku życia – 12 godzin).

Triacyt MR zostaje wydany przede wszystkim z moczem.

Dawkowanie - Triacyt MR 60 tabletek

Szczegółowy sposób dawkowania zawsze ustala lekarz. Tabletek nie należy rozgryzać, lecz połknąć w całości, a do popijania zaleca się wybrać wyłącznie wodę (sok lub inne napoje mogą zmienić działanie leku). Lek najlepiej zażywać podczas posiłków.

W razie pominięcia dawki nie należy uzupełniać jej podwójną porcją, ale trzymać się ustalonego harmonogramu. W przypadku przedawkowania trzeba skontaktować się z przychodnią lub szpitalem, najlepiej mając przy sobie opakowanie i ulotkę.

O czym poinformować lekarza?

Przed zażyciem preparatu należy poinformować lekarza o wszystkich schorzeniach oraz lekach stosowanych obecnie i w przeszłości (również tych, które są wydawane bez recepty). Bardzo ważną informacją jest także ciąża lub karmienie piersią – w każdym z tych przypadków lekarz indywidualnie oceni sytuację pacjentki i zdecyduje o sposobie farmakoterapii, wybierając najbezpieczniejszy preparat.

Przeciwwskazania do stosowania leku

Przeciwwskazaniami do zażywania tabletek Triacyt MR są: alergia na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą, choroba Parkinsona i różnego typu zaburzenia ruchowe (np. zespół niespokojnych nóg), poważne choroby nerek. Przeszkodę może stanowić także wiek (powyżej 75. roku życia), co jednak oceni lekarz, odnosząc się do stanu zdrowia danego pacjenta.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, również Triacyt MR może wywoływać różne skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Najczęściej odnotowane działania niepożądane dotyczą zaburzeń ze strony układu pokarmowego (np. biegunka, nudności, wymioty), a także nerwowego (np. zawroty i ból głowy). Pacjenci zgłaszali też osłabienie i dolegliwości alergiczne (np. pokrzywkę).

Inne skutki uboczne to:

występujące rzadko, m.in.: palpitacje serca, tachykardia, omdlenia, zachwiania równowagi, złe samopoczucie;
- pojawiające się z nieznaną częstotliwością: bezsenność lub nadmierna senność, zaparcia, obrzęki twarzy mogące utrudnić oddychanie, zaburzenie funkcjonowania wątroby, objawy parkinsonizmu.

U osób dotkniętych zaburzeniami ruchowymi lub zażywających leki mające na celu regulację ciśnienia może dojść do upadków.

O każdym zauważonym u siebie działaniu niepożądanym należy poinformować lekarza prowadzącego, który może zmodyfikować sposób dawkowania leku. Większość niepokojących objawów powinna ustąpić po przerwaniu leczenia (nie można jednak samodzielnie decydować o zakończeniu terapii).

Prowadzenie pojazdów mechanicznych

Ze względu na możliwość wystąpienia skutków ubocznych w postaci senności lub zawrotów głowy, należy poinformować lekarza o planowanym prowadzeniu samochodu lub obsłudze innych maszyn mechanicznych.

Cena leku

Odpłatność za lek wynosi 100% (aktualnie nie jest refundowany). Triacyt MR można zakupić wyłącznie po okazaniu farmaceucie recepty.

Zamawianie i odbieranie leków na receptę

Lek Triacyt MR można zamówić za pośrednictwem naszej strony internetowej, a następnie odebrać w jednej z aptek partnerskich Świata Leku. Podczas wizyty w aptece farmaceuta poprosi o ważną receptę i tylko na jej podstawie wyda zamówienie. Płatność odbywa się na miejscu – pokrywają Państwo wyłącznie koszt leku, dostawa do wybranej apteki jest darmowa.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki

dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.