

# Tribiotic, maść antybakteryjna, 1g, 10 saszetek



Nasza cena: 16,87 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1G
Opakowanie	* 10 sasz.
Postać	MASC
Producent	KATO LABS SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NEOMYCINUM, POLYMYXINUM B, BACITRACINUM

## Opis produktu

### Opis

Maść antybakteryjna.

### Dawkowanie - Tribiotic, maść antybakteryjna, 1g, 10 saszetek

Lek należy stosować raz do trzech razy na dobę. Niewielką ilość leku należy nanieść na zmienione chorobowo miejsce na skórze, po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu skóry. W razie konieczności można zastosować ochronny, jałowy opatrunek. Stosować nie dłużej niż 7 dni.

Dzieci: Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko uszkadzającego słuch i nerki działania leku.

### Składniki - Tribiotic, maść antybakteryjna, 1g, 10 saszetek

1 g maści zawiera:

substancje czynne: 10 mg bacytracyna cynkowa, 5 mg neomycyny siarczan, 0,833 mg polimyksyny B siarczan, substancję pomocniczą: wazelina biała.

### Działania

Lek zawiera trzy antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego.

### Wskazania - Tribiotic, maść antybakteryjna, 1g, 10 saszetek

Zapobieganie rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń.

### Przeciwwskazania - Tribiotic, maść antybakteryjna, 1g, 10 saszetek

Nie stosować leku:

- w nadwrażliwości na bacytracynę cynkową, neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- na błony śluzowe,
- na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry,
- na głębokie lub klute rany, ciężkie oparzenia,
- do oczu,
- na sączące zmiany skórne.

### Przeciwwskazania - Tribiotic, maść antybakteryjna, 1g, 10 saszetek

Lek może uszkadzać słuch, powodować wystąpienie ogólnych objawów nadwrażliwości i miejscowych jak: wysypka, świąd, objawy podrażnienia oraz zakażeń opornymi szczepami bakterii lub grzybów (drożdżaki). Jeśli nasila się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią niewymienione objawy niepożądane, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

### Uwagi

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**