

Trimeductan MR (Coreductal MR) 35 mg 60 tabletek

Nasza cena: 14,75 zł

Opis słownikowy

Dawka	35MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	LEK-AM ZAKROCZYN P.F. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TRIMETAZIDINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania - Trimeductan MR (Coreductal MR) 35 mg 60 tabletek

Trimetazydyna jest wskazana w terapii skojarzonej w objawowym leczeniu pacjentów dorosłych ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające albo nie jest tolerowane.

Dawkowanie - Trimeductan MR (Coreductal MR) 35 mg 60 tabletek

1 tabletkę 2 razy na dobę, przyjmowaną podczas posiłków. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), zalecana dawka wynosi 1 tabl. rano, podczas śniadania. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u dzieci poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Dawkowanie - Trimeductan MR (Coreductal MR) 35 mg 60 tabletek powinno być ustalone z lekarzem.

Działanie

Wyniki badań przeprowadzonych in vitro oraz in vivo potwierdziły cytoprotekcyjne działanie trimetazydyny poprzez ochronę struktur i funkcji komórek należących do różnych tkanek i narządów przed skutkami niedotlenienia i niedokrwienia.

Skład

1 tabletkę o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodoru.

Przeciwwskazania - Trimeductan MR (Coreductal MR) 35 mg 60 tabletek

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe.
- Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

Działania niepożądane

Całe spektrum działań niepożądanych znajduje się w ulotce załączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.