

Trivagin żel 30 ml



Nasza cena: 22,81 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Postać	ZEL
Producent	VERCO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Trivagin żel stosuje się pomocniczo w leczeniu infekcji okolic intymnych w celu łagodzenia objawów infekcji bakteryjnych i grzybiczych takich jak: świąd, pieczenie, zaczerwienienie i podrażnienia towarzyszące upławom.

Wskazania:

Wyrób medyczny może być stosowany wspomagająco w przebiegu:

- leczenia zapalenia sromu różnego pochodzenia, w tym grzybiczego i bakteryjnego,
- cukrzycy i chorób wyniszczających, sprzyjających rozwojowi zakażeń grzybiczych,
- połogu i menopauzy,
- antybiotykoterapii,
- antykoncepcji,
- uczulenia na środki piorące, bieliznę czy dezodoranty,
- wtórnego zapalenia sromu spowodowanego przesadną higieną,
- jak również profilaktycznie, w sytuacjach utrudnionej higieny: przed i po korzystaniu z basenu, sauny, solarium, w podróży.
- Wyrób przeznaczony dla kobiet i dzieci powyżej 3 roku życia.

Działanie:

Łagodzi objawy infekcji grzybiczych bakteryjnych, takie jak: świąd, pieczenie, zaczerwienienie i podrażnienia towarzyszące upławom.

Nawilża przywraca naturalną barierę ochronną okolic intymnych, dzięki czemu chroni je przed rozwojem flory patogennej.

Utrzymuje właściwe pH odpowiedzialne za tworzenie bariery ochronnej skóry i wspomaga odbudowę naturalnej flory bakteryjnej sromu i krocza.

Eliminuje suchość skóry i błon śluzowych.

Nie brudzi bielizny i nie pozostawia uczucia lepkości. Jest łatwy w użyciu.

Zalety produktu:

natychmiastowa ulga w świądzie i podrażnieniu intymnym u 100% badanych kobiet [1]

unikalny skład

wygoda stosowania – nie brudzi bielizny, nie pozostawia uczucia lepkości

Skład:

Woda, oksyetylenowany alkohol laurylowy, glicerol, fenoksyetanol, kopolimer kwasu akrylowego i alkilometakrylanu, alfa-glukan, trójetanoloamina, dioctan glutaminianu i tetrasodowego, etyloheksylogliceryna, polisacharydy, hialuronian sodu, kwas mlekowy

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem żelu, dokładnie umyj i osusz okolice intymne. Rozprowadź ciekłą warstwę żelu na skórę zewnętrznych narządów płciowych w kierunku od przodu do odbytu. Stosuj w zależności od potrzeb, 2-3 razy dziennie. Przed i po użyciu żelu dokładnie umyj ręce. Żel nie brudzi bielizny.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.