

# Trusopt krople do oczu 2% 5 ml

Nasza cena: 6,90 zł

## Opis słownikowy

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Dawka             | 2%                       |
| Opakowanie        | 5 ml                     |
| Postać            | KROPLE DO OCZU           |
| Producent         | SANTEN OY FINLANDIA [FI] |
| Rejestracja       | Lek na receptę           |
| Substancja czynna | DORZOLAMIDUM             |

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Lek wydawany jest na polecenie lekarza i jest stosowany w celu leczenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z: nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem, jaskrą torebkową i innymi wtórnymi przypadkami jaskry z otwartym kątem.

### Dawkowanie:

Krople do oczu stosowane w monoterapii podaje się następująco: zakropić 1 kroplę do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3x/dobę. W leczeniu wspomagającym, wraz ze stosowanymi miejscowo lekami  $\beta$ -adrenolitycznymi, podaje się do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 1 kroplę preparatu, 2x/dobę.

### Działanie:

Krople do oczu obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe.

### Skład:

1 ml roztw. zawiera 22,26 mg chlorowodoru dorzolamidu co odpowiada 20 mg dorzolamidu.

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

### Działania niepożądane:

W przeprowadzonych długotrwałych badaniach klinicznych u pacjentów leczonych produktem leczniczym w monoterapii lub jako lekiem uzupełniającym w leczeniu lekami  $\beta$ -adrenolitycznymi w postaci okulistycznej, najczęstszym (u około 3% pacjentów) powodem przerwania leczenia produktem leczniczym były działania niepożądane dotyczące oczu, a przede wszystkim stwierdzenie zapalenia spojówek i reakcji ze strony powiek. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy; (rzadko) zawroty głowy, parestezje. Zaburzenia oka: (bardzo często) pieczenie i kłucie; (często) powierzchwne punktowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie; (niezbyt często) zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego; (rzadko) podrażnienie, w tym zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu terapii), odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych; (nieznana) uczucie ciała obcego w oku.

**Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**