

Tussidrill, syrop przeciwkaszlowy 5mg/5ml, 150 ml



Nasza cena: 15,33 zł

Opis słownikowy

Dawka	5MG/5ML
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	150ml
Postać	SYROP
Producent	PIERRE FABRE FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DEXTROMETHORPHANUM

Opis produktu

Opis

Tussidrill, syrop przeciwkaszlowy 5mg/5ml, 150 ml

Opioidowy lek przeciwkaszlowy.

Dawkowanie - Tussidrill, syrop przeciwkaszlowy 5mg/5ml, 150 ml

Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 6 lat. Zwykła dawka wynosi 1 mg na kilogram masy ciała na dobę, podzielona na 4 dawki podawane w odstępach 6 godzinnych. Np. dla dziecka o masie ciała 20 kg 1 łyżeczka miarowa 4 razy na dobę. Nie stosować dawki jednorazowej większej niż 0,25 mg/kg masy ciała. Leczenie objawowe powinno być krótkotrwałe (do 5 dni). 1 łyżeczka (1 miarka) zawiera 5 ml syropu (5 mg bromowodorku dekstrometorfanu).

Składniki - Tussidrill, syrop przeciwkaszlowy 5mg/5ml, 150 ml

5 ml syropu zawiera:

- bromowodorek dekstrometorfanu 5 mg.
- substancje pomocnicze: maltitol ciekły, metylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy, zapach karmelowy 28A 103, kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Działania

Preparat zawiera substancję dekstrometorfan (pochodną morfiny), która hamuje odruch kaszlowy poprzez działanie ośrodkowe. W dawkach terapeutycznych bromowodorek dekstrometorfanu nie działa hamująco na czynność ośrodka oddechowego, nie powoduje przyzwyczajenia lub powstania nałogu.

Wskazania - Tussidril, syrop przeciwkaszlowy 5mg/5ml, 150 ml

Doraźnie w ostrym, suchym kaszlu.

Przeciwwskazania - Tussidril, syrop przeciwkaszlowy 5mg/5ml, 150 ml

Leku nie stosować w następujących przypadkach:

- nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
- niewydolność oddechowa i ryzyko jej wystąpienia
- kaszel astmatyczny
- leczenie inhibitorami MAO.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat życia.

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przeciwwskazania - Tussidril, syrop przeciwkaszlowy 5mg/5ml, 150 ml

Możliwe jest występowanie senności, zawrotów głowy, zaparć, nudności, wymiotów, reakcji alergicznych (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli).

Uwagi

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy związanych ze stosowaniem preparatu. Osoby kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny powinny być tego świadome.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.