

Uniben 1,5 Mg/ml, aerozol 30 ml



Nasza cena: 13,45 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5 MG/ML
Opakowanie	30ml
Postać	AER.
Producent	UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BENZYDAMINUM

Opis produktu

Opis

Dawkowanie - Uniben 1,5 Mg/ml, aerozol 30 ml

Lek Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.

Dzieci poniżej 6 lat:

1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę.

Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 lat:

Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli:

Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminu chlorowodoru.

Uwaga: Stosowanie leku Uniben nie powinno trwać dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz.

Składniki - Uniben 1,5 Mg/ml, aerozol 30 ml

1 ml roztworu zawiera:

substancję czynną: 1,5 mg benzydaminu chlorowodoru;

substancje pomocnicze: glicerol, sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, polisornat 20, aromat miętowy (Aromat fresh peppermint506041T), woda oczyszczona.

Uniben zawiera substancję czynną – benzydaminu chlorowodorek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), która działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco.

Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dolegliwości szybko ustępują. Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Wskazania - Uniben 1,5 Mg/ml, aerozol 30 ml

Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania - Uniben 1,5 Mg/ml, aerozol 30 ml

Kiedy nie należy stosować leku Uniben

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przeciwwskazania - Uniben 1,5 Mg/ml, aerozol 30 ml

Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwałe, może spowodować uczulenie. W przypadku braku poprawy po krótkotrwałym stosowaniu leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek może powodować uczulenie, ponieważ zawiera metylu parahydroksybenzoesan.

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu substancji czynnej zawartej w leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługa maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.