

Upsarin C, tabletki musujące, 20 szt.



Nasza cena: 22,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	TABL.MUS.
Producent	Bristol Myers Squibb
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w leczeniu objawowym grypy i przeziębienia.

Dawkowanie - Upsarin C, tabletki musujące, 20 szt.

Dorośli: 1 do 2 tabletek jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową dla dorosłych wynosi 3g kwasu acetylosalicylowego i 1g kwasu askorbowego. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę ze względu na zawartość witaminy C.

Osoby w podeszłym wieku: 1 do 2 tabletek jednorazowo. maksymalna dawka dobową dla osób w podeszłym wieku wynosi 2g kwasu acetylosalicylowego i 1 g kwasu askorbowego. Nie należy przyjmować dawki większej niż 5 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 12 do 15 lat: 1 tabletkę jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtórzyć co 4 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową kwasu acetylosalicylowego wynosi 50 mg/kg mc. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę. Jeśli pomimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe utrzymują się ponad 5 dni lub gorączka ponad 3 dni należy zasięgnąć porady lekarza. Tabletkę należy rozpuścić w szklance wody, mleka lub soku owocowego i natychmiast po rozpuszczeniu wypić

Składniki - Upsarin C, tabletki musujące, 20 szt.

1 tabletkę musującą zawiera substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 330mg, kwas askorbinowy (witamina C) 200mg oraz substancje pomocnicze.

Działania

Kwas acetylosalicylowy działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo oraz przeciwbólowo. Kwas askorbinowy, czyli witamina C jest niezbędna w procesach oksydoredukcyjnych, odpornościowych i detoksykacyjnych zachodzących w komórkach organizmu. Dodatek w leku witaminy C jest korzystny w przebiegu chorób przeziębieniowych, podczas których występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C.

Wskazania - Upsarin C, tabletki musujące, 20 szt.

- Stany gorączkowe.
- Bóle różnego pochodzenia (głowy, stawów, mięśni, zębów, nerwobóle).

Przeciwwskazania - Upsarin C, tabletki musujące, 20 szt.

- Nadwrażliwość (uczulenie) na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
- skazy krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi,
- ostatni trymestr ciąży, okres okołoporodowy,
- okres karmienia piersią,
- dna moczanowa,
- czynne krwawienie: do jamy ciała, do ośrodkowego układu nerwowego, krwawienie maciczne, krwawienia z ran, w tym pooperacyjnych,
- kamica nerkowa,
- u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanych podawaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek
- ciężka niewydolność serca

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.