

# Urofort płyn doustny 100 g

Nasza cena: 21,00 zł



## Opis słownikowy

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Opakowanie  | 100 g                   |
| Postać      | PLYN                    |
| Producent   | LEKI NATURY POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty         |

## Opis produktu

### Opis

Urofort jest stosowany jako tradycyjny środek pobudzający wydzielanie moczu, zapobiegający stanom zapalnym dróg moczowych oraz kamicy nerkowej.

### Dawkowanie - Urofort, płyn 100 g

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 4 ml leku 5 razy na dobę.  
Lek należy przyjmować po posiłku. Odpowiednią dawkę należy rozcieńczyć małą ilością wody.

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką do dozowania leku.

### Składniki - Urofort, płyn 100 g

100g leku zawiera:  
- Extractum fluidum (1:1) compositum ex:  
- Uvae ursi folium (liść mącznicy) - 45,0g  
- Solidaginis herba (ziele nawłoci) - 35,0g  
- Urticae herba (ziele pokrzywy) - 20g

Opakowanie preparatu zawiera 1,50 g arbutyny.

### Wskazania - Urofort, płyn 100 g

Środek stosowany tradycyjnie w piasku nerkowym (kamicy nerkowej), pomocniczo w stanach zapalnych dróg moczowych i nerek, w zakażeniach moczowodów i pęcherza moczowego.

## Przeciwwskazania - Urofort, płyn 100 g

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik leku. Leku Urofort nie należy stosować u dzieci, gdyż zawiera 40-50% obj. etanolu. Nie stosować wymuszonej diurezy przy obrzękach spowodowanych ograniczeniem czynności serca i nerek.

## Przeciwwskazania - Urofort, płyn 100 g

Jak każdy lek Urofort może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza. Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych przy zachowaniu zalecanego dawkowania i sposobu podawania.

## Uwagi

W przypadku infekcji dróg moczowych utrzymujących się dłużej niż dwa tygodnie należy skonsultować się z lekarzem. Preparat zawiera alkohol etylowy może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach umysłowych. W czasie terapii Urofortem należy pić dużo płynów oraz stosować dietę alkalinizująca mocz oraz unikać żywności oraz leków zakwaszających mocz. Nie zleca się przyjmowania produktu przed prowadzeniem pojazdu, gdyż alkohol może zostać wykryty w powietrzu wydychanym.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**