

Urofuraginum Max tabletki 100mg x 30



Nasza cena: 19,85 zł

Opis słownikowy

Dawka	100MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Adamed Consumer Healthcare S.a.
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	FURAZIDINUM

Opis produktu

Opis

Urofuraginum Max to lek bez recepty przeciwko zakażeniom dolnych dróg moczowych zawierający furaginę.

Składniki:

1 tabletkę zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum)

Działania:

Bakteriobójcze.

Wskazania:

Zakażenia dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Przeciwwskazania:

Zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, neuropatia obwodowa (do jej wystąpienia szczególnie predysponują: niewydolność nerek, niedokrwistość, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witaminy B), reakcje nadwrażliwości, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne, bóle brzucha, wymioty), stany zapalne trzustki, łysienie, złuszczone zapalenie skóry, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na pochodne nitrofuranu, świąd, pokrzywka, wysypka, objawy polekowego zapalenia wątroby, niedokrwistość megaloblastyczna lub hemolityczna u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie powinien zaburzać sprawności psychomotorycznej.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie na pochodne nitrofuranu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, zaburzenia neurologiczne, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego, choroby płuc, cukrzyce. Gdy stosuje antybiotyki aminoglikozydowe, tetracykliny, leki zwiększające wydzielanie kwasu moczowego, leki zubożniające, preparaty zawierające atropinę. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosować w I trymestrze ciąży.

Należy zachować szczególną ostrożność w III trymestrze ciąży. Lek jest przeciwwskazany u kobiet w donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i w okresie porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. Z uwagi na przenikanie furaginy do mleka kobiecego, leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.