

UroIntima Furagi Active 50 mg, 30 tabletek



Nasza cena: 23,23 zł

Opis słownikowy

Dawka	50 MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	FURAZIDINUM

Opis produktu

Opis

UROintima FuragiActive to preparat zwalczający zakażenia dolnych dróg moczowych. Ma działanie bakteriostatyczne – jego substancja czynna, czyli furagina, uniemożliwia komórkom bakteryjnym prawidłowy rozwój i rozmnażanie się. Jej dużą zaletą jest fakt, iż nie odnotowano jeszcze wykształcenia szczepu bakterii na nią opornych. Lek dostępny jest bez recepty, pod postacią tabletek powlekanych.

Wskazania:

Preparat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 15. rok życia w celu leczenia ostrych oraz przewlekłych, niepowikłanych zakażeń bakteryjnych dolnej części układu moczowego, które objawiają się bólem i pieczeniem, a także częstszą niż zazwyczaj potrzebą oddania moczu.

Dawkowanie:

UROintima FuragiActive przyjmujemy doustnie, tabletki popijając wodą. Ważne jest, by zażywać lek podczas posiłków zawierających białko, gdyż ułatwia to wchłanianie się substancji w nim zawartych. Zalecana dawka preparatu to 2 tabletki zażyte 4 razy dziennie przez pierwszy dzień kuracji oraz 2 tabletki zażyte 3 razy dziennie przez kolejne dni. Terapia powinna trwać 7-8 dni, z możliwością powtórzenia jej po upływie 10-15 dni.

Możliwe skutki uboczne:

Lek może być przyczyną wystąpienia efektów niepożądanych, takich jak: nudności, bóle głowy, wzmożone oddawanie gazów, senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skórne reakcje alergiczne, gorączka, dreszcze, kaszel, zaburzenia nerwów obwodowych, zmiany w obrazie morfologicznym krwi, duszności, zmiany w obrazie radiologicznym płuc, zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc, biegunka, wzdęcia, zapalenie ślinianek, wymioty, zapalenie trzustki, tęsknienie, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, ogólne złe samopoczucie, a także zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby.

Przeciwwskazania:

Po lek nie powinni sięgać pacjenci uczuleni na któryś z jego składników, nie jest także wskazane, by był on zażywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Przed rozpoczęciem terapii należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych równocześnie lekach oraz przebytych oraz aktualnych schorzeniach.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.