

Urosal, 300 mg + 300 mg, lek na zapalenie pęcherza moczowego, 20 tabletek



Nasza cena: 23,59 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Opakowanie | *20 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | VIS ZAKŁADY CHEM-FARM.KATOWICE POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | METHENAMINUM, PHENYLI SALICYLAS |

Opis produktu

Opis

Urosal, 300 mg + 300 mg, lek na zapalenie pęcherza moczowego, 20 tabletek

Urosal to lek stosowany w kompleksowym leczeniu i profilaktyce zakażeń układu moczowego¹. Dzięki skojarzonej aktywności dwóch substancji aktywnych (metenaminy i salicylanu fenylu), Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych.

Urosal działa odkażająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Lek zwalcza przyczyny zakażeń układu moczowego, dzięki działaniu przeciwdrobnoustrojowemu obu substancji czynnych¹. Dodatkowo, z uwagi na zawartość salicylanu fenylu, Urosal wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, dzięki czemu lek usuwa także objawy infekcji.

Wskazania

Lek Urosal stosuje się w:

- zapaleniu pęcherza moczowego,
- odmiedniczkowym zapaleniu nerek,
- zapaleniu miedniczek nerkowych,
- stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,
- w bieguncie i nieżyście jelit.

Co zawiera lek Urosal - skład

1 tabletkę zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg fenylu salicylanu oraz substancje pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, sacharozę,

magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię (typ A), laktozę jednowodną, talk, żelatynę, sodu laurylosiarczan.
Postać farmaceutyczna: tabletki.

Jak stosować lek Urosal?

Doustnie: 3 razy na dobę 1 tabletkę po jedzeniu, popijając wodą.
W przypadku wrażenia, że działanie produktu leczniczego jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku Urosal?

Kiedy nie stosować leku Urosal:

- Nie należy zażywać leku Urosal, jeśli występuje nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność nerek, choroba wrzodowa, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczna znacznego stopnia, odwodnienie.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Urosal należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W przypadku astmy oskrzelowej nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

Inne leki i Urosal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować z sulfonamidami. Z uwagi na zawartość salicylanów lek nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, przeciwgorączkowych, oraz leków mogących wpływać niekorzystnie na przewod pokarmowy i układ krwiotwórczy. W przypadku leków przeciwzakrzepowych interakcja ta może powodować wystąpienie krwawień.

Stosowanie leku Urosal z jedzeniem i piciem

Stosować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach

Lek zawiera cukry – sacharozę i laktozę. Zapoznaj się z informacjami ważnymi przed zastosowaniem leku Urosal.

Lek Urosal – możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

- bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;
 - często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;
 - niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;
 - rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;
 - bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
 - częstość nieznaną: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
- Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia układu pokarmowego

Rzadko: podrażnienie jelit i bóle brzucha

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz

Częstość nieznana: krwinkomocz (obecność krwinek w moczu)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: skórne odczyny alergiczne

Tabletki Urosal – jak przechowywać?

- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS” sp. z o.o.

ul. Św. Elżbiety 6a

41-905 Bytom

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.