


Vagical, globulki dopochwowe 10 sztuk



Nasza cena: 21,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	GLOB.VAG.
Producent	FARMINA KRAKÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HOMEOPATHIC MEDICINALIS PRODUCT

Opis produktu

Opis

Vagical Calendula officinalis TM – 150 mg, globulki 10 sztuk

Produkt leczniczy OTC

Dzięki korzystnemu składowi opartemu o naturalne, doskonale przebadane substancje czynne, Vagical świetnie sprawdza się przy podrażnieniach, otarciach, dyskomforcie czy początkach infekcji w okolicy kobiecych narządów rodnych.

Zawarty w globulkach Vagical wyciąg z nagietka lekarskiego działa przyczynowo - przeciwgrzybicznie i przeciwbakteryjnie oraz objawowo – przeciwzapalnie, wspomagając gojenie i proces regeneracji. Vagical działa ściśle w miejscu podania co sprawia, że nie wywołuje interakcji z innymi lekami oraz antykoncepcją doustną.

Po uprzednim zwilżeniu dobrze rozpuszcza się w wydzielinie błony śluzowej i uwalnia substancje czynną już po paru minutach, łagodząc objawy i zmniejszając świąd. Vagical osłania zmienione błony śluzowe, chroniąc przed utratą wilgoci i wnikaniem drobnoustrojów.

Wskazania

Stany zapalne dróg rodnych objawiające się upławami, świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem okolicy warg sromowych.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Skład

Nalewka macierzysta z nagietka lekarskiego (Calendula Officinalis TM), glikol polioksyetylenowy.

Sposób użycia

Lek przeznaczony jest do podawania dopochwowego. Dorosłe kobiety: 1 globulka 2-3 razy dziennie. Przed zastosowaniem globulkę należy zwiłżyć przegotowaną, ostudzoną wodą.

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44,

30-721 Kraków

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.