

Valzek 80 mg 28 tabletek

Nasza cena: 4,86 zł

Opis słownikowy

Dawka	80MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	CELON PHARMA SP. Z .O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	VALSARTANUM

Opis produktu

Opis

Valzek 80 mg, 28 tabletek

Wskazania:

Zaleca się stosowanie produktu, gdy u pacjenta wystąpią dolegliwości związane z:

- nadciśnieniem tętniczym,
- niewydolnością serca,

Lek może być również stosowany:

- W leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz nadciśnienia u dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat,
- Po świeżo przeżytym zawale mięśnia sercowego,
- W leczeniu dorosłych pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory po świeżo przeżytym (12 h-10 dni) zawale mięśnia sercowego.

Dawkowanie:

Nadciśnienie tętnicze:

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego wynosi 80 mg 1 x na dobę.

Stan po świeżo przeżytym zawale mięśnia sercowego:

U pacjentów w stabilnym stanie klinicznym leczenie może być rozpoczęte już po 12 godzinach od rozpoznania zawału mięśnia sercowego. Po zastosowaniu dawki początkowej 20 mg 2 x na dobę, dawkę walsartanu należy stopniowo zwiększać przez następnych kilka tygodni do 40 mg, 80 mg i 160 mg 2 x na dobę.

Szczegółowe informacje na temat stosowania leku zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Lek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Działanie:

Walsartan jest czynnym po podaniu doustnym, silnym i specyficznym antagonistą receptora angiotensyny II (Ang II). Działa wybiórczo na podtyp receptora AT1, który jest odpowiedzialny za znane działania angiotensyny II. Zwiększone stężenie angiotensyny II w osoczu po zablokowaniu receptora AT1 przez walsartan może stymulować odblokowany receptor AT2, który wydaje się działać antagonistycznie w stosunku do działania receptora AT1. Walsartan nie wykazuje nawet częściowej aktywności agonistycznej w stosunku do receptora AT1 i ma dużo większe (około 20 000 razy) powinowactwo do receptora AT1 niż do receptora AT2. Nie stwierdzono, aby walsartan wiązał się lub blokował inne receptory hormonów lub kanały jonowe, o których wiadomo, że są istotne w regulacji sercowo-naczyniowej.

Skład:

1 tabletkę zawiera 80 mg walsartanu.

Przeciwwskazania:

Nie zaleca się stosowania leku jeżeli u pacjentów występuje:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
- marskość żółciowa wątroby,
- holestaza,
- II i III trymestr ciąży.

Działania niepożądane:

- zmniejszenie stężenia hemoglobiny,
- zmniejszenie wartości hematokrytu,
- neutropenia,
- małopłytkowość
- zwiększenie stężenia potasu w surowicy,
- zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
- zapalenie naczyń krwionośnych.
- kaszel
- ból brzucha

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
- zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy.
- obrzęk naczynioruchowy,
- pęcherzowe zapalenie skóry,
- wysypka,
- świąd.
- ból mięśni.
- niewydolność i zaburzenia czynności nerek,
- zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy.
- uczucie zmęczenia

Wymienione powyżej działania niepożądane to tylko część działań które mogą występować podczas stosowania leku. W celu zapoznania się z innymi działaniami niepożądanymi należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.