

Vanatex 160 mg 28 tabletek powlekanych

Nasza cena: 11,12 zł

Opis słownikowy

Dawka	160MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	VALSARTANUM

Opis produktu

Opis

Vanatex 160 mg, 28 tabletek powlekanych

Wskazania:

Nadciśnienie tętnicze:

- leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego
- stan po świeżo przeżytym zawale mięśnia sercowego.
- leczenie dorosłych pacjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawową niewydolnością serca

Niewydolność serca:

- leczenie objawowej niewydolności serca

Dawkowanie:

Nadciśnienie tętnicze:

- zaleca się stosowanie dawki początkowej 80 mg raz na dobę,
- działanie leku jest zauważalne w ciągu 2 tygodni,

- dawkę lek można zwiększyć do 160 mg, a maksymalnie do 320 mg.

Stan po świeżo przeżytym zawale mięśnia sercowego:

- dawka początkowa wynosi 20 mg 2 razy na dobę,

- następnie dawkę tą można zwiększyć stopniowo do 40 mg, 80 mg i 160 mg, podawanych 2 razy na dobę.

Niewydolność serca:

- zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg 2 razy na dobę,

- dawka leku może zostać zwiększona 80 mg i 160 mg podawanych 2 razy na dobę, należy jednak pamiętać, aby zwiększenie dawki odbywało się co najmniej w dwu tygodniowych odstępach.

Działanie:

- obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 160 mg walsartanu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjenta występuję jakiegokolwiek przeciwwskazania do których należą:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

- marskość żółciowa wątroby i cholestaza,

- II i III trymestr ciąży.

Działania niepożądane:

Do najczęstszych działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku można zaliczyć:

- niedociśnienie tętnicze,

- niedociśnienie ortostatyczne,

- niewydolność i zaburzenia czynności nerek,

- osłabienie,

- uczucie zmęczenia.

Pacjenci, którzy są zainteresowani innymi działaniami niepożądanymi, które występują znacznie rzadziej niż te wymienione powyżej powinni zapoznać się z ulotką informacyjną dołączona do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub też farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.