

Vanatex 80 mg 28 tabletek powlekanych

Nasza cena: 5,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	80MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	VALSARTANUM

Opis produktu

Opis

Vanatex 80 mg, 28 tabletek powlekanych

Wskazania

Lek jest zalecany do stosowania :

- nadciśnienie tętnicze
- niewydolność serca
- stan po świeżo przeżytym zawale serca

Dawkowanie

Dawkowanie leku ustala lekarz, indywidualnie dla pacjenta.

W przypadku nadciśnienia tętniczego: zalecana dawka początkowa to 80 mg raz/dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wyraźnie zauważalne w ciągu 2 tyg., a maksymalny stopień zostaje osiągnięty w ciągu 4 tyg.

Stan po świeżo przeżytym zawale mięśnia sercowego: u pacjentów w stabilnych klinicznie leczenie może być rozpoczęte już po 12 h od momentu rozpoznania zawału mięśnia sercowego. Dawka początkowa to 20 mg 2x/dobę. Przez następnych kilka tygodni należy stopniowo zwiększać dawkę do 40 mg, 80 mg i 160 mg, podawanych 2x/dobę. Dawkę początkową zapewnia podzielna tabletki 40 mg. Niewydolność serca: zalecana dawka początkowa to 40 mg 2x/dobę. Dawkę początkową zapewnia podzielna tabletki 80 mg. Zwiększanie dawki kolejno do 80 mg i 160 mg podawanych 2x/dobę powinno być przeprowadzane w odstępach co najmniej dwutygodniowych, do uzyskania największej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Dzieci i młodzież: lek można stosować u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Dawka początkowa wynosi 40 mg raz/dobę w przypadku dzieci o wadze ciała mniejszej niż 35 kg oraz 80 mg raz/dobę w przypadku dzieci o wadze większej niż 35 kg .

Działanie

Substancja czynna zawarta w produkcie walsartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II lub sartanami. .Odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego, prowadząc do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera 80 mg walsartanu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną walsartan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w produkcie.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość żółciowa wątroby.

Ciąża II i III trymestr.

Nie należy stosować preparatu z produktami zawierającymi aliskiren. Przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.