

Venescin, 30 tabletek drażowych

Nasza cena: 11,29 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	DRAŻ.
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AESCLUS HIPPOCASTANUM, RUTOSIDUM, AESCU

Opis produktu

Opis

Venescin, 30 tabletek drażowych

VENESCIN - jest to preparat złożony zawierający w swoim składzie wyciąg z nasion kasztanowca, który działa przeciwobrzękowo i zwiększa tonus żył.

Dawkowanie:

Stosować doustnie 3 razy dziennie po 2 tabletki drażowane.

Skład VENESCIN:

1 tabletkę zawiera:

Substancje czynne:

- Hippocastani seminis extractum siccum (5,5-8:1) 25 mg (ekstrahent 70% v/v etanol),

- Rutosidum 15 mg,

- Aesculinum 0,5 mg,

oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, kalafonia, olej rycynowy, guma arabska, talk, sacharoza, indygotyna, żółcień chinolinowa.

Działanie:

Venescin jest preparatem zawierającym w swoim składzie wyciągu z nasion kasztanowca, rutozyd i eskulinę. Stosowanie preparatu zwiększa tonus żył oraz zmniejsza przepuszczalność i zwiększa odporność mechaniczną naczyń włosowatych.

Wskazania - Venescin, drażetki, 30 szt.:

Lek stosuje się w łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności żyłnej.

Przeciwwskazania - Venescin, drażetki, 30 szt.:

Nie należy stosować leku Venescin jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
Nie podawać dzieciom.

Ciąża:

Nie stosować w I trymestrze ciąży. Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w pozostałym okresie ciąży, preparat może zostać użyty wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Działania niepożądane:

Zwykle nie obserwuje się działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu.
Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, bóle brzucha.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

Przeciwwskazania - Venescin, drażetki, 30 szt.

Zwykle nie obserwuje się działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu.
Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, bóle brzucha.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.