

Venescin żel, 40g



Nasza cena: 19,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	ZEL
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TROXERUTINUM, AESCULUS HIPPOCASTANUM

Opis produktu

Opis

Venescin żel, 40g

Żel Venescin zawiera wyciąg gęsty z nasion kasztanowca o zawartości 17% escyny i trokserutyne.

Dawkowanie - Venescin, żel, 40g

Lek do stosowania zewnętrznego: nakładać 2 razy dziennie (zaleca się stosowanie rano i wieczorem). Niewielką ilość żelu (ok. 2 cm) po nałożeniu delikatnie wcierać.

Składniki - Venescin, żel, 40g

(100 g żelu zawiera):

- Hippocastani seminis extractum spissum 11,8 g, Ekstrahent: etanol 70%

- Troxerutinum 2,0 g

Substancje pomocnicze:

Carbopol 5984, glicerol, glikol propylenowy, etanol, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, wodorotlenek sodu, woda. ad 100 g

Działania

Przyjmuje się, że produkt zawierający połączenie escyny oraz trokserutyne, wpływa na naczynia żyłne m.in. zmniejszając ich przepuszczalność oraz wpływa na napięcie żyłne. Żel działa przeciwobrzętkowo.

Wskazania - Venescin, żel, 40g

Venescin żel stosuje się w początkowych objawach przewlekłej niewydolności żyłnej (w bólu, uczuciu ciężkości i puchnięciu nóg, kurczach łydek oraz w przypadku objawów występujących po urazach (obrzęki, krwiaki).

Przeciwwskazania - Venescin, żel, 40g

Nie należy stosować leku Venescin żel:

- przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku
- na otwarte rany, błony śluzowe i obszary skóry poddane napromienieniu w radioterapii

Przeciwwskazania - Venescin, żel, 40g

Lek Venescin może powodować działania niepożądane:

- podrażnienie skóry i błon śluzowych
- wystąpienie alergii
- wystąpienie pokrzywki, a także uogólnione opóźnione odczyny nadwrażliwości takie, jak kontaktowe zapalenie skóry, niekiedy odczyny natychmiastowe z pokrzywką i skurczem oskrzeli
- podrażnienie i suchość skóry

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Lek Venescin żel nie powinien być stosowany w okresie ciąży i laktacji bez zasięgnięcia porady lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie jest znany wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.