

Venotrex 200mg, 64 kapsułki



Nasza cena: 35,62 zł

Opis słownikowy

Dawka	200MG
Opakowanie	*64
Postać	KAPS.
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TROXERUTINUM

Opis produktu

Opis

Venotrex 200mg, 64 kapsułki

VENOTREX jest mieszaniną czterech różnych hydroksyetylorutozydów (trokserutyna).

Dawkowanie - Venotrex 200mg, kapsułki, 64 szt

2 kapsułki twarde 200 mg 3 razy na dobę lub 1 kapsułka twarda 300 mg 4 razy na dobę, przez 2 do 4 tygodni.

W leczeniu podtrzymującym lub w przypadku nawrotów zaleca się dawkowanie: 2 kapsułki twarde 200mg 2 razy na dobę lub 1 kapsułka twarda 300mg 3 razy na dobę. Leczenie podtrzymujące powinno trwać 3 do 4 tygodni.

Składniki - Venotrex 200mg, kapsułki, 64 szt

1 kapsułka: substancja czynna: trokserutyna (O-beta-hydroksyetylorutozydu) 200,0mg, substancje pomocnicze: laktoza, skrobia ziemniaczana, laurylosiarczan sodu, dwutlenek krzemu.

Działania

Lek jest mieszaniną czterech różnych hydroksyetylorutozydów (trokserutyna).

Działają one ochronnie na naczynia krwionośne i limfatyczne. Zapewniają im odpowiednie napięcie, elastyczność, zmniejszają przepuszczalność - usprawniając przepływ krwi i limfy. Zwiększają plastyczność krwinek czerwonych, przeciwdziałają pękaniu włosowatych naczyń krwionośnych i limfatycznych.

Wskazania - Venotrex 200mg, kapsułki, 64 szt

W leczeniu objawowym w przypadku niewydolności krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (uczucie ciężkości nóg, ból, kurcze nocne, żylaki) oraz w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żyłakami odbytu.

Przeciwwskazania - Venotrex 200mg, kapsułki, 64 szt

Nadwrażliwość na hydroksyetylorutozydy.

Działania niepożądane podano poniżej z następującą częstotliwością występowania przypadków:

bardzo często - więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów.

często - mniej niż u 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów

niezbyt często - mniej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów

rzadko - mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko- mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- rzadko - wysypka skórna, świąd, pokrzywka

- bardzo rzadko - nadwrażliwość na światło, łysienie

- Zaburzenia żołądka i jelit:

- rzadko: wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, niestrawność, uczucie dyskomfortu w żołądku

- bardzo rzadko: nudności, wymioty

- Zaburzenia układu nerwowego:

- bardzo rzadko: bóle i zawroty głowy, zmęczenie

- Zaburzenia układu immunologicznego:

- bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcja rzekomoanafilaktyczna, nadwrażliwość.

- Zaburzenia naczyniowe:

- bardzo rzadko: uderzenia gorąca

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

- bardzo rzadko: zmęczenie, znużenie

- Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe:

- bardzo rzadko: bóle stawowe.

Uwagi

W przypadku występowania obrzęków w okolicach kostek spowodowanych chorobami serca, wątroby lub nerek nie należy stosować leku VENOTREX.

Ciąża: Brak jest danych o ewentualnym niekorzystnym działaniu leku na płód. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, podobnie w czasie karmienia piersią.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.