

## Venożel, żel 100 g

Nasza cena: 41,62 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	100g
Producent	Pharmaswiss Czechy [Cz]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DICLOFENACUM, TRIBENOSIDUM, ESCINUM

### Opis produktu

#### Opis

## Venożel, żel 100 g

Venożel jest to preparat do stosowania miejscowego o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i osłaniającym naczynia krwionośne.

#### Skład i działanie:

Jest to preparat złożony zawierający diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny oraz tribenozyd i escynę, substancje działające osłaniająco na naczynia krwionośne. Diklofenak przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie diklofenaku polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Diklofenak zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej i działa przeciwbólowo. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Tribenozyd działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, zapobiega uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego. Łagodzi uczucie zwiększonego napięcia tkanek. Escyna ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Zarówno tribenozyd jak i escyna zmniejszają przepuszczalność naczyń, co ogranicza rozwój reakcji zapalnej i zmniejsza obrzęk. Po zastosowaniu miejscowym preparatu wchłanianie substancji czynnych zależy od zastosowanej dawki, wielkości leczonego obszaru, czasu kontaktu preparatu ze skórą i od właściwości powierzchni na którą zastosowano preparat.

#### Wskazania:

Preparat jest wskazany w:

- zapaleniu żył kończyn dolnych
- obrzękach pooperacyjnych i pourazowych, obrzękach zastoinowych kończyn dolnych
- zespołach bólowych związanych z chorobami kręgosłupa
- bólach mięśni i stawów po urazach (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania)
- ograniczonych i łagodnych postaciach zapalenia stawów.

#### Dawkowanie:

Preparat ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę. Wielkość dawki zależy od wielkości powierzchni, na którą stosowany jest żel. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie

