Venożel, żel 50g

Nasza cena: 24,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50g
Producent	Pharmaswiss Czechy [Cz]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DICLOFENACUM, TRIBENOSIDUM, ESCINUM

Opis produktu

Opis

Venożel, żel 50g

Wskazania - Venożel, 50g:

Zapalenie żył kończyn dolnych, obrzęki pooperacyjne i pourazowe, obrzęki zastoinowe kończyn dolnych, zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa, pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania), ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów.

Dawkowanie - Venożel, 50g i sposób użycia:

VENOŻEL należy stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Po aplikacji lek rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba, że to ręce są miejscem leczonym.

Dawkowanie - Venożel, 50g u dzieci: ze względu na brak danych klinicznych nie zaleca się stosowania leku VENOŻEL u dzieci poniżej 12 lat.

Składniki - Venożel, 50g

Substancje czynne: diklofenak sodu (Diclofenacum natricum) 12 mg/g, trybenozyd (Tribenosidum) 10 mg/g, escyna (Escinum) 5 mg/g. Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania - Venożel, 50g

Rozpoznana nadwrażliwość na diklofenak, trybenozyd, escynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; uszkodzona lub zmieniona zapalnie skóra oraz otwarte rany; trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią; u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka czy

ostre nieżyty nosa są wywołane po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

PRODUCENT

Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria