

Veral 1% żel 55 g



Nasza cena: 9,98 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 %
Opakowanie	55 g
Postać	ZEL
Producent	Recordati Polska Polska [P]
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Substancją czynną zawartą w leku Veral w postaci żelu 1% jest diklofenak, pochodna kwasu fenylooctowego wykazująca działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Dawkowanie - Veral, żel, 1%, 55g

Zwykle 3 do 4 razy na dobę 2 g do 4 g żelu (ilość odpowiadająca wielkości czereśni lub orzecha włoskiego, wystarczająca do posmarowania powierzchni około 400 cm² do 800 cm²). Nanieść na chore miejsca i rozetrzeć.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce. Należy unikać kontaktu żelu z oczami oraz błoną śluzową jamy ustnej.

Składniki - Veral, żel, 1%, 55g

1 g kremu zawiera:

- substancja czynna: 10 mg diklofenaku sodowego.

- substancje pomocnicze: alkohol etylowy 96%, alkohol izopropylowy, amonowego wodorotlenku roztwór 10%, karbomer, woda oczyszczona.

Działania

Mechanizm działania diklofenaku polega na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn i innych czynników odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnego z bólem i obrzękiem oraz podwyższoną ciepłotą ciała.

Wskazania - Veral, żel, 1%, 55g

Lek Veral wskazany jest do stosowania w miejscowym leczeniu:

- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (np. zapalenie ścięgien i (lub) mięśni),

- ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów,

- bólu pleców.

Przeciwwskazania - Veral, żel, 1%, 55g

- W przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej alergię na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (astma, aspirynowa, pokrzywka, ostre nieżyty nosa).

Leku nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży.

Przeciwwskazania - Veral, żel, 1%, 55g

Często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry, w tym kontaktowe zapalenie skóry.

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów): miejscowe zapalenie skóry z wysypką, świądem, zaczerwienieniem, obrzękiem, obecnością grudek, łuszczeniem się skóry lub uczuciem palenia skóry, pęcherzykowe zapalenie skóry.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach): wysypka grudkowata, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, astma, reakcje nadwrażliwości na światło.

Uwagi

Lek należy do grupy NLPZ, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Nie należy stosować leku podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży. Karmienie piersią - przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.