

# Vermox 100 mg 6 tabletek

Nasza cena: 3,20 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,1 G
Opakowanie	*6
Postać	Tabletki
Producent	GEDEON RICHTER LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	MEBENDAZOLUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Lek Vermox jest wskazany do stosowania w leczeniu infestacji pojedynczych lub mieszanych pasożytami z gatunków: *Enterobius vermicularis* (owsiki); *Ascaris lumbricoides* (glista ludzka); *Trichuris trichura* (włosogłówka); *Ancylostoma duodenale* (tęgoryjec dwunastniczy); *Necator americanus* (tęgoryjec amerykański).

### Dawkowanie leku Vermox

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2. roku życia: Dzieci w wieku powyżej 2 lat mogą otrzymywać takie same dawki, jakie zalecane są dla pacjentów dorosłych, niezależnie od ich mc. i wieku. Dorośli i dzieci powyżej 2 lat: Owsica: 1 tabl. (100 mg) podana jako pojedyncza dawka. Ponieważ reinwazje są bardzo częste, zaleca się powtórzenie kuracji po upływie 2 i 4 tyg. Glistnica, zarażenie włosogłówką, tęgoryjcem i zakażenie mieszane: 2 x 1 tabl. (2 x 100 mg) /dobę, rano i wieczorem, przez trzy kolejne dni.

### Działanie:

Mebendazol jest kompleksowym lekiem przeciworobaczym, o szerokim spektrum działania. Stosuje się go zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi, mebendazol działa miejscowo w świetle jelita, zaburzając proces tworzenia tubuliny w komórkach jelita pasożytów. Mebendazol wiąże się swoiście z tubuliną i powoduje ultrastrukturalne zmiany degeneracyjne jelita, blokując pobór glukozy i prawidłowe trawienie w organizmie pasożyta. Zaburzenia te są tak silne, że prowadzą do autolizy. Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo.

### Skład:

1 tabletka Vermox zawiera 100 mg mebendazolu.

## Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

## Działania niepożądane:

Jeśli produkt leczniczy stosowany jest w zalecanych dawkach, zazwyczaj nie powoduje żadnych dolegliwości. Notowano sporadycznie ból brzucha i biegunkę u pacjentów z maszyną infestacją. Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk naczynioruchowy, wykwity skórne, wysypka, pokrzywka.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.