

Verospiron 50 mg 30 tabletek

Nasza cena: 4,36 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	GEDEON RICHTER LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	SPIRONOLACTONUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- zastoinowa niewydolność serca,
- marskość wątroby z wodobrzuszem i obrzękiem,
- wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego,
- zespół nerczycowy,
- diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Dawkowanie:

- produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i pod jego nadzorem.
- nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.
- dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta zgodnie z jego zapotrzebowaniami.
- w zależności od dolegliwości oraz wskazaniami do stosowania leku dawka początkowa wynosi od 25mg do 200mg.
- dawka podtrzymująca w niektórych przypadkach może osiągać poziom 400mg na dobę.

Działanie:

- hamuje wchłanianie zwrotne wody i jonów Na⁺ oraz wydalanie jonów K⁺
- hamuje wydalanie jonów H⁺ z moczem.
- moczopędne
- obniżające ciśnienie tętnicze.

Skład:

1 kapsułka zawiera 50mg spironolaktonu.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- bezmocz,
- ostra niewydolność nerek,
- ciężkie zaburzenia czynności nerek,
- hiperkaliemia,
- choroba Addisona,
- jednoczesne stosowanie eplerenonu lub innych leków moczopędnych oszczędzających potas.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. Należy zauważyć iż działania niepożądane nie muszą objawiać się u każdego z pacjentów stosujących produkt. Ich przebieg również może różnić się w zależności od pacjenta. W razie wystąpienia jakichkolwiek z działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Więcej informacji na temat działań niepożądanych zostało zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

- hiperkaliemia,
- niemierność u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów stosujących jednocześnie produkty zawierające potas,
- nudności,
- wymioty,
- zmniejszenie libido,
- zaburzenia erekcji,
- ginekomastia (u mężczyzn),
- tkliwość piersi, ból piersi (u mężczyzn),
- powiększenie piersi, zaburzenia miesiączkowania (u kobiet)
- bezpłodność-w przypadku stosowania dużych dawek (450 mg /dobę).

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu

życiu lub zdrowiu.