

Verrucutan (100 mg + 5 mg)/g roztwór na skórę 13 ml

Nasza cena: 37,16 zł

Opis słownikowy

Dawka	(0,1G+5MG)/G
Opakowanie	1 BUT.A 13ML
Postać	ROZT.NA SKORE
Producent	SUN-FARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ACIDUM SALICYLICUM, FLUOROURACILUM

Opis produktu

Opis

Verrucutan (100 mg + 5 mg)/g roztwór na skórę 13 ml

Verrucutan, (5 mg + 100 mg)/g, roztwór na skórę jest to lek stosowany w leczeniu brodawki zwykłej (szczególnie brodawki na obciążonych naciskiem miejscach na podeszwie stopy), brodawki płaskie młodocianych na kończynach.

Dawkowanie

Preparat Verrucutan należy stosować od 2 do 3 razy na dobę, na każdą brodawkę.

Zazwyczaj średni czas leczenia wynosi 6 tygodni. W trakcie leczenia należy być systematycznym i pamiętać o codziennej aplikacji leku. Gdy zmiany chorobowe ustąpią należy kontynuować kurację jeszcze przez jeden tydzień.

Sposób aplikacji:

Verrucutan należy nanosić tylko i wyłącznie na brodawkę starając się ominąć zdrową skórę. Jednym ze sposobów ochrony skóry otaczającej brodawkę jest posmarowanie jej kremem lub maścią.

Przed aplikacją preparatu łopatka musi być czysta. W przypadku małych brodawek należy dostosować narzędzie do jej wielkości np. zastosować wykałaczkę.

Przed aplikacją Verrucutan należy usunąć powłokę po poprzednim zastosowaniu.

W przypadku brodawek okołopaznokciowych, a zwłaszcza podpaznokciowych, należy upewnić się czy nie uległa zniszczeniu macierz paznokcia i produkt nie przedostał się do łożyska paznokcia.

Skład

Substancje czynne:

1 g roztworu zawiera 5 mg fluorouracylu i 100 mg kwasu salicylowego

Wykaz substancji pomocniczych:

- 80 mg/g Dimetylosulfotlenek
- Etanol bezwodny
- Etylu octan
- Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer (80:20)
- Piroksylina

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.