

Vertigoheel, tabletki, 50 szt.



Nasza cena: 30,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	HEEL NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HOMEOPATHIC MEDICINALIS PRODUCT

Opis produktu

Opis

Vertigoheel jest pomocny w chorobie lokomocyjnej, gdy występują nudności, zawroty głowy, drażliwość. Mogą go przyjmować zarówno małe dzieci, jak i dorośli. Lek ten nie powoduje bólów głowy, senności i braku koncentracji. Jest dostępny bez recepty w postaci tabletek podjęzykowych.

Dawkowanie - Vertigoheel, tabletki, 50 szt.

1. Zawroty głowy: zwykle 3 razy dziennie 3 tabletki podjęzykowo. W napadowych zawrotach głowy początkowo 1 tabletkę co 15 minut (przez ok. 2 godziny).
2. Choroba lokomocyjna: zwykle na dzień przed podróżą i w czasie podróży podaje się 1 tabletkę 3 razy dziennie podjęzykowo. W przypadku ostrych dolegliwości 1 tabletkę co 15 minut przez 2 godziny.
3. U dzieci lek podaje się również na dzień przed podróżą i w czasie podróży: poniżej 3 lat: na dzień przed podróżą 1/2 tabletki podjęzykowo 3 razy dziennie w czasie podróży 1/2 tabletki podjęzykowo co 30 minut, nie więcej niż 6 tabletek na dobę. powyżej 3 lat: na dzień przed podróżą 1 tabletkę podjęzykowo 3 razy dziennie w czasie podróży 1 tabletkę podjęzykowo co 30 minut, nie więcej niż 12 tabletek na dobę.

Składniki - Vertigoheel, tabletki, 50 szt.

Petroleum rectificatum D8, Ambra grisea D6, Conium maculatum D3, Anamirta cocculus D4, zawiera laktozę

Działania

Lek zastosowany dzień przed podróżą oraz w jej trakcie znosi objawy choroby lokomocyjnej.

Wskazania - Vertigoheel, tabletki, 50 szt.

Zawroty głowy różnego pochodzenia (zwłaszcza na tle miażdżycowym). Choroba lokomocyjna. Szumy uszne.

Przeciwwskazania - Vertigoheel, tabletki, 50 szt.

Nie stwierdzono

Przeciwwskazania - Vertigoheel, tabletki, 50 szt.

Nie stwierdzono

Uwagi

Vertigoheel nie działa uspokajająco i nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Zażywanie leku nie wpływa na tolerancję alkoholu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.