

# VIAGRA CONNECT MAX, 4 tabletki powlekane

Nasza cena: 73,86 zł



## Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*4
Postać	TABL.POWL.
Producent	UPJOHN EESV HOLANDIA [NL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SILDENAFILUM

## Opis produktu

### OPIS

Lek Viagra Connect Max zawiera substancję czynną sildenafil, stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

### SKŁAD

Substancją czynną jest *sildenafil*.

Każda tabletki powlekana zawiera cytrynian sildenafilu w ilości równoważnej 50 mg sildenafilu.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, indygotyna (E 132).

### DZIAŁANIE LEKU

Viagra Connect Max wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu i zwiększa napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

### DAWKOWANIE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować 1 tabletkę, zależnie od potrzeb, około godziny przed aktywnością seksualną. Tabletkę należy połączyć w całości, popijając wodą.

Nie należy przyjmować w ciągu doby więcej niż 1 tabletkę.

### WSKAZANIA

Lek Viagra Connect Max jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub

utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego. Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi chorobami serca i wątroby, niskim ciśnieniem, po niedawno przeżytym udarze lub zawale, z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa) oraz jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

## DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy.

Często (może występować u 1 na 10 pacjentów): nudności, niestrawność, zatłoczony nos, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (nagłe uczucie gorąca w górnej części ciała), widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia.

Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów): wymioty, ból w nadbrzuszu, refluks (włączając zgagę), wysypka skórna, ból kończyn górnych lub dolnych, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia, podrażnienie oka, zaczerwienienie oczu, ból gałek ocznych, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, nadwrażliwość na światło, łzawienie, kołatanie serca (palpitacje), przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, spadek ciśnienia tętniczego (typowe objawy to zawroty głowy, omdlenie, niewyraźne widzenie, nudności i uczucie zmęczenia), bóle mięśniowe, senność, zmniejszona wrażliwość na dotyk, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne, suchość w jamie ustnej, zatłoczone zatoki, nieżyt nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatłoczony nos), obecność krwi w moczu.

Rzadko (może występować u 1 na 1000 pacjentów): omdlenie, suchość nosa, obrzęk śluzówki nosa, drażliwość oraz nagłe pogorszenie lub nagła utrata słuchu; nagły, niespodziewany zgon, spowodowany zaburzeniami czynności serca (nagłe zatrzymanie krążenia), udar mózgu, zawał serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), nieregularne bicie serca, przemijający spadek dopływu krwi do niektórych części mózgu; uczucie dławienia się, drętwienie w jamie ustnej; krwawienie w tylnym odcinku gałki ocznej, podwójne widzenie, pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia czuciowe w obrębie gałki ocznej, obrzęk gałki ocznej lub powieki, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie twardówki (białka) oka; krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu.

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA LEKU

Ważne jest, aby w ciągu pierwszych 6 miesięcy stosowania leku DoppelSil Max po konsultacji z lekarzem wykluczyć inne poważne choroby, które mogą być przyczyną zaburzeń erekcji, takie jak: choroby serca i naczyń krwionośnych, cukrzyca, nadciśnienie, podwyższone stężenie cholesterolu.

Należy skonsultować zastosowanie leku z lekarzem w przypadku występowania kiedykolwiek ponad 4-godzinnej erekcji, nawet bez podniecenia seksualnego, anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego, dolegliwości ze strony serca, choroby wrzodowej; zaburzeń krzepnięcia.

Nie należy przyjmować leku, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Viagra Connect Max zawiera laktozę.

Viagra Connect Max nie jest przeznaczony dla kobiet.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

## INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Viagra Connect Max może wchodzić w interakcje z: lekami z grupy azotanów, uwalniającymi tlenek azotu, riociguat, z grupy alfa-adrenolityków, stosowanymi w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego oraz niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusem HIV.

Nie należy przyjmować równolegle z innymi lekami zawierającymi sildenafil.

## CIĄŻA I KARMIENTE PIERSIĄ

Lek Viagra Connect Max nie jest przeznaczony dla kobiet.

## STOSOWANIE LEKU Z ALKOHOLEM, JEDZENIEM I PICIEM

Obfity posiłek może opóźnić początek działania produktu leczniczego Viagra Connect Max.  
Nie należy przyjmować leku Viagra Connect Max z sokiem grapefruitowym, ponieważ może on wpływać na działanie leku.  
Przed zażyciem leku przeciwwskazane jest spożywanie znacznych ilości alkoholu.

#### STOSOWANIE U DZIECI

Leku nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia.

#### PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGA MASZYN

Należy zachować ostrożność gdyż lek może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn (zawroty głowy, zaburzenia widzenia).

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**