

Vibovit Junior o smaku truskawkowym, 2g, 30 saszetek



Nasza cena: 32,73 zł

Opis słownikowy

Dawka	2G
Opakowanie	*30
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Vibovit Junior w postaci saszetek do rozpuszczania w wodzie jest produktem wielowitaminowym przeznaczonym dla dzieci powyżej 3 roku życia jako uzupełnienie codziennej diety w 10 podstawowych witamin. Zawarte w produkcie witaminy są niezbędne do przebiegu podstawowych procesów metabolicznych i prawidłowego rozwoju młodego organizmu.

Dawkowanie - Vibovit Junior o smaku truskawkowym, 2g, 30 saszetek

Dzieci od 4 do 6 roku życia doustnie lub 1 saszетка dziennie (po rozpuszczeniu w odpowiedniej ilości płynu). Napój zaleca się podawać podczas posiłku. Dzieci w wieku 7-12 lat: 2 saszетки dziennie.

Składniki - Vibovit Junior o smaku truskawkowym, 2g, 30 saszetek

W 1 saszetce: witamina E 3,5mg, kwas pantotenowy 1,5mg, witamina B2 0,7mg, witamina B6 0,7mg, witamina B1 0,6mg, witamina A 300mcg, witamina D 2,5mcg, witamina B12 0,5mcg, niacyna 7mg, witamina C 25mg.

Działania

Wpływa korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka, zapobiega niedoborom witaminowym w tym okresie życia i wzmacnia po przebytych chorobach.

Wskazania - Vibovit Junior o smaku truskawkowym, 2g, 30 saszetek

Zapobiegawczo i leczniczo u dzieci w wieku od 4 do 12 lat. W okresach wzmożonego zapotrzebowania na witaminy (niedobory witaminowe, objawy niedożywienia, brak łaknienia, okres zimowo-wiosenny, rekonwalescencja po przebytych chorobach, zabiegach chirurgicznych, antybiotykoterapii, pomocniczo w leczeniu chorób zakaźnych).

Przeciwwskazania - Vibovit Junior o smaku truskawkowym, 2g, 30 saszetek

Hiperwitaminoza A lub D. Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi witaminę A i D. Fenylketonuria.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.