

# Vicebrol Forte 30 tabletek

Nasza cena: 19,16 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	VINPOCETINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

#### Produkt Vicebrol Forte został stworzone w celu:

- łagodzenie objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru
- łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów związanych z zaburzeniami krążenia mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych,
- leczenia wspomagającego zaburzenia wzroku o podłożu naczyniowym,
- leczenia wspomagającego zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego.

### Dawkowanie:

Dawka leku oraz sposób jego podania ustalane są indywidualnie dla każdego pacjenta.

- zazwyczaj stosuje się dawkę: 1 tabletkę 3 razy na dobę, tak jakby 30 mg.
- działanie leku rozpoczyna się po około tygodniu stosowania,

### Działanie:

- wpływa korzystnie na metabolizm mózgowy i przepływ krwi w mózgu,
- wykazuje właściwości reologiczne krwi,

- działa osłonowo na tkankę nerwową,
- łagodzi szkodliwy wpływ reakcji cytotoksycznych wywołanych przez aminokwasy.

### **Skład:**

1 tabletkę zawiera 5 mg winpocetyny.

### **Przeciwwskazania:**

**Lek jest przeciwwskazany do stosowania jeżeli u pacjentów występują następujące dolegliwości:**

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- ciężka choroba niedokrwienności i zaburzenia rytmu serca,
- krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego,
- okres ciąży i karmienie piersią.

Produkt nie powinien być również stosowany przez dzieci i młodzież

### **Działania niepożądane:**

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane.

### **Należą do nich między innymi:**

- zaburzenia rytmu serca,
- obniżenie odcinka ST,
- wydłużenie odcinka QT,
- częstoskurcz i skurcze dodatkowe,
- zmiany ciśnienia krwi,
- zaczerwienienie skóry twarzy,
- leukopenia,
- zaburzenia snu,
- zawroty i bóle głowy,
- osłabienie,
- mrowienie kończyn,
- wzmożone pocenie się,
- nadaktywność ruchowa,
- nudności,
- zgaga,

- suchość błony śluzowej jamy ustnej.

W celu poznania innych działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą bądź też zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.