

## Vidisic żel do oczu 10 g (import równoległy)

Nasza cena: 16,57 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	10 g
Postać	ZEL D/OCZU
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CARBOMERUM

### Opis produktu

#### Opis

Vidisic żel do oczu w postaci kropli jest to preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zapewniający odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek.

#### Skład i działanie:

Preparat zawiera kwas poliakrylowy, wielkocząsteczkowy polimer. Kwas poliakrylowy wiąże wodę, tworząc strukturę o właściwościach hydrożelu. Tworzy na rogówce warstwę ochronną, jest substancją wiskoelastyczną, posiada właściwości fizykochemiczne pozwalające na stosowanie go w preparatach tzw. „sztucznych łez”. Żel dobrze przylega do powierzchni rogówki, charakteryzuje się odpowiednią lepkością i elastycznością, zapewnia długotrwałe nawilżenie rogówki. W warunkach fizjologicznych, odpowiednia wilgotność powierzchni rogówki zapewniana jest przez przylegającą do powierzchni oka cienką warstwę płynu łzowego. Jeśli ilość lub skład płynu łzowego jest zaburzona występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, co prowadzi do zespołu suchego oka i objawów takich jak: podrażnienie, pieczenie, suchość, uczucie piasku w oku, ból i nadwrażliwość na światło. Przyczyny zespołu suchego oka mogą obejmować zmniejszenie wytwarzania łez u osób w podeszłym wieku, pracę w klimatyzowanym pomieszczeniu lub przy komputerze, zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, zanieczyszczenie środowiska i inne.

#### Wskaznia:

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym suchego zapalenia rogówki i spojówek.

#### Dawkowanie:

Preparat ma postać żelu do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zalecanych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli

masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 3–5 razy na dobę lub częściej, oraz około 30 minut przed snem.

W przypadku stosowania długotrwałego zalecana jest okresowa konsultacja z lekarzem okulistą.

Po otwarciu preparat może być stosowany nie dłużej niż przez 6 tygodni. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiegokolwiek powierzchni. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć.

W przypadku miejscowego stosowania innych kropli okulistycznych, należy zachować 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków. W przypadku miejscowego stosowania innych maści okulistycznych, należy zachować 15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków. Preparat powinien być stosowany jako ostatni.

Więcej o kroplach do oczu znajdą Państwo w artykule " Krople do oczu – jakie mają działanie i w jaki sposób je stosować".

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**