

VIGANTOL 20 000IU (IMP.ROW.BULGARIA), krople, 10 ml



Nasza cena: 21,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	KROP.DOUSTNE
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	VITAMINUM D

Opis produktu

Opis

VIGANTOL 20 000IU (IMP.ROW.BULGARIA), krople, 10 ml

Vigantol w postaci kropeł jest to jedyna na rynku witamina D3 jako lek dostępny bez recepty.

Zawiera 500 mikrogramów/ml

Wskazania

- zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
- zapobieganiu krzywicy u wcześniaków.
- zapobiega niedoborom witaminy D3 i zmniejsza ryzyko ich występowania
- zapobiegania schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D3 u dzieci i dorosłych.
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych

Zalety stosowania preparatu

- może być stosowany od pierwszych dni życia,
- zalecana dla wcześniaków
- jedyna witamina D3 w kroplach będąca lekiem dostępnym bez recepty

Dawkowanie

Jak stosować u wcześniaków?

2 krople na dobę roztworu Vigantol. Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.

Jak stosować Vigantol u noworodków i niemowląt?

Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca): 1 kropla na dobę, co odpowiada 500 IU witaminy D₃. u wcześniaków, noworodków i niemowląt. Lek zawsze należy stosować pod nadzorem lekarza.

Jak stosować Vigantol w przypadku leczenia osób dorosłych?

Dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol, co odpowiada 500 IU witaminy D₃.

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol, co odpowiada 1000 IU witaminy D₃.

Jak podawać lek?

Vigantol należy podawać z łyżką mleka lub pokarmu. Jeśli krople dodaje się do butelki lub do pokarmu, należy upewnić się, czy dziecko zjadło cały posiłek, w przeciwnym razie dawka nie będzie przyjęta w całości.

Pamiętaj, aby przy wyznaczaniu dawki uwzględnić zawartość witaminy D₃ w pokarmie, jeśli ten jest bogaty w witaminę D₃ i stosuje się go jednocześnie z Vigantoletem.

Noworodki karmione piersią, których matki przyjmowały witaminę D₃ w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji witaminy D₃ począwszy od trzeciego tygodnia życia.

Noworodki karmione piersią, których matki nie otrzymywały witaminy D₃ w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji witaminy D₃ począwszy od pierwszych dni życia.

Noworodki karmione mlekiem modyfikowanym, spożywające w ciągu doby objętość mleka, która dostarcza należną ilość 400 IU na dobę, nie wymagają suplementacji witaminy D₃.

U osób dorosłych i starszych dzieci vigantol należy podawać z łyżką płynu.

Skład

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol (witamina D₃) Pozostałe składniki: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. Witamina D₃ jest ważna w procesie tworzenia kości. W niedoborach witaminy D₃ występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).

Substancja czynna

1 kropla zawiera 12,5 mikrogramów cholekalcyferolu, co odpowiada 500 j.m. witaminy D₃

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.