

Vigor+ Cardio 1000ml



Nasza cena: 54,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1000 ml
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Składniki:

sacharoza, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, wyciąg z owoców głogu (*Crataegus spp.*), substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; amid kwasu nikotynowego, glukonian żelaza (II), octan DL-alfa tokoferylu, barwnik: azorubina, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawiny 5'-fosforan sodowy, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilmonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

Sposób użycia:

zalecana porcja dzienna 60 ml (4 łyżki stołowe). Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Dobowa porcja (4 łyżki stołowe tj. 60 ml) zawiera:

- wyciąg z owoców głogu – 60 mg
- niacyna – 16 mg (100%*)
- żelazo – 14 mg (100%*)
- witamina E – 12 mg (100%*)
- witamina B6 – 1,4 mg (100%*)
- witamina B2 – 1,4 mg (100%*)

- witamina B1 – 1,1, mg (100%*)

- kwas foliowy – 200 µg (100%*)

- witamina B12 – 2,5 µg (100%*)

*ZDS – Zalecane Dienne Spożycie

Przechowywanie:

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci. Produkt po otwarciu przechowywać w lodówce.

Ostrzeżenia i inne informacje:

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. Suplement diety VIGOR CARDIO zawiera barwnik azorubinę. Azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.