

Vita Buerlecithin, 1000 ml



Nasza cena: 54,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1000ml
Producent	Takeda Pharma Polska [PI]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LECITHINUM

Opis produktu

Opis

Vita Buerlecithin, 1000 ml

Preparat zawierający naturalną lecytynę otrzymywaną z soi z dodatkiem witamin.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej: 1 łyżkę stołową (20 ml) 3 razy na dobę.
Przy większym osłabieniu organizmu dawkę można podwoić.

Skład

100 ml preparatu: lecytyna 10,4 g (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający fosfatydocholiny, kefaliny i inozytofosfaty); sól sodowa fosforanu ryboflawiny 4,8 mg (odpowiada ca. 3,5 mg wit. B2); wit. B6 chlorowodorek 3,5 mg; wit. B12 cyjanokompleks 2,5 mcg; D-pantotnian sodowy 20 mg; amid kwasu nikotynowego 35 mg. Wszystkie preparaty buerlecytynowe podlegają stałej kontroli naukowej.

Działanie

Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi bogate źródło choliny, będącej budulcem substancji przekaźnikowej acetylocholino, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych. Lecytyna bierze udział w przemianie materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.

Witaminy z grupy B uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu nerwowego. D-pantotnian sodowy wpływa na czynność przewodu

pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.

Wskazania

Obniżenie zdolności koncentracji, zmniejszenie sprawności, sytuacje stresowe, przeciążenie fizyczne i psychiczne, przemęczenie, choroby wieku starczego, stany nerwicowe, także nerwica serca, bezsenność, niedobór witamin grupy B. Stosuje się zapobiegawczo i leczniczo przy zwiększonym poziomie cholesterolu we krwi, w arteriosklerozie. Skraca czas koniecznego wypoczynku w rekonwalescencji, po porodzie.

Przeciwwskazania

Nie stosuje się u dzieci. Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku. Ze względu na obecność sacharozy i laktozy leku nie należy stosować u osób z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Przeciwwskazania

Rzadko mogą pojawić się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, stolce tłuszczowe, biegunka).

Uwagi

Preparat zawiera 16,4 % alkoholu. Dzienna dawka (60 ml) preparatu zawiera 0,41 jedn. Chlebowej. Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.