

Vitamina A+ D3 2000J + 400J Hasco, 50 kapsułek



Nasza cena: 8,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50 blister
Postać	KAPS.
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	RETINOLUM, WITAMINA D

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w celu uzupełnienia niedoborów witaminy A i D3. Wskazane osobom krótko przebywającym na słońcu.

Dawkowanie - Vitamina A+ D3 2000J + 400J Hasco, 50 kapsułek

Lek stosuje się doustnie. Profilaktycznie zwykle stosuje się 1-2 kapsułki na dobę.

Składniki - Vitamina A+ D3 2000J + 400J Hasco, 50 kapsułek

1 kapsułka: Vitaminum A 2000 j.m., Vitaminum D3 400 j.m.; substancje pomocnicze: olej arachidowy, żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa (E 104), czerwień koszenilowa (E 124).

Działania

Witamina A bierze udział w kostnieniu i tworzeniu struktury kości, jest niezbędna do wzrostu, regeneracji, różnicowania się i czynności nabłonka skóry i błony śluzowej. Ponadto odgrywa istotną rolę w procesie widzenia. Witamina D3 jest bioregulatorem przemian wapnia i fosforu w organizmie, odpowiedzialna jest za utrzymanie stanu równowagi między tymi dwoma pierwiastkami - głównymi składnikami budulcowymi kośćca. Niedobór witaminy D prowadzi do osteomalacji (rozmiękczenia kości) u ludzi dorosłych oraz zrzestotnienia, porowatości i kruchości układu kostnego (osteoporozy) u osób starszych.

Wskazania - Vitamina A+ D3 2000J + 400J Hasco, 50 kapsułek

Zapobieganie niedoborom witaminy A i D3. Preparat polecany szczególnie osobom mało przebywającym na słońcu.

Przeciwwskazania - Vitamina A+ D3 2000J + 400J Hasco, 50 kapsułek

Hiperwitaminoza A lub D; nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; uczulenia na orzeszki ziemne lub soję; nadmierne stężenie wapnia we krwi; nadmierne wydalanie wapnia z moczem; kamica nerkowa; stosowanie innych preparatów zawierających

witaminę A i D; gdy osoba jest unieruchomiona.

Przeciwwskazania - Vitamina A+ D3 2000J + 400J Hasco, 50 kapsułek

Witaminy A i D3 stosowane zgodnie zalecanym dawkowaniem są na ogół dobrze tolerowane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.