

Vitaminum A+E Gsk, 2500+50 jm, kapsułki, 30 szt.



Nasza cena: 5,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	2500j.m.+50mg
Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	Omega Pharma Poland Sp.z O.o
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Vitaminum A+E GSK jest lekiem zawierającym witaminę A oraz witaminę E.

Dawkowanie - Vitaminum A+E Gsk, 2500+50 jm, kapsułki, 30 szt.

Lek stosować doustnie:

Zapobiegawczo: zwykle jedna kapsułka na dobę.

W niedoborach: jedna kapsułka 2 lub 3 razy na dobę.

Składniki - Vitaminum A+E Gsk, 2500+50 jm, kapsułki, 30 szt.

Substancje czynne:

- witamina A (retynolu octan) - 2500j.m.,

- witamina E (all-rac-alfa-tokoferylu octan) - 50mg,

- substancje pomocnicze: oktylu galusan, olej arachidowy oczyszczony.

Skład otoczki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona.

Działania

Witamina A (retinol) jest niezbędna do prawidłowego procesu widzenia, rozmnażania, wzrostu, regeneracji i różnicowania czynności nabłonków, a także do wzrostu i rozwoju kości oraz do zachowania właściwego stanu błon śluzowych. W siatkówce oka retinol ulega przemianie tworząc barwnik wzrokowy - rodopsynę - konieczną do adaptacji wzroku w ciemności. Niedobór witaminy A prowadzi do ślepoty zmierzchowej, wysychania spojówek, rozmiękania rogówki a w ciężkich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty. Może być także powodem zmian skórnych, nadmiernego rogowacenia skóry, uszkodzeń (mataplazji) nabłonka błon śluzowych oraz zmniejszenia odporności na zakażenia.

Witamina E hamuje utlenianie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wolnych rodników i nadtlenuków.

Witamina E działa ochronnie na błony komórkowe i lizosomalne (wewnątrzkomórkowe), zwiększa również odporność krwinek czerwonych na hemolizę.

Wskazania - Vitaminum A+E Gsk, 2500+50 jm, kapsułki, 30 szt.

Lek stosować:

- w zapobieganiu niedoborom witamin A i E

Niedobory tych witamin mogą prowadzić do zaburzeń wzrostu, upośledzenia odporności organizmu za zakażenia, ślepoty zmierzchovej, zmian chorobowych nabłonków i błon śluzowych.

- w przypadku wzmożonego zapotrzebowania na witaminę A i E, Wzmożone zapotrzebowanie na te witaminy może wystąpić w przypadkach narażenia na stres, przy zwiększonym wysiłku fizycznym i nieprawidłowej diecie.

Przeciwwskazania - Vitaminum A+E Gsk, 2500+50 jm, kapsułki, 30 szt.

Nie należy stosować leku jeśli występuje:

- nadwrażliwość na witaminę A lub E, albo na inne składniki preparatu,
- hiperwitaminoza A (nadmiar witaminy A w organizmie),
- hiperwitaminoza E (nadmiar witaminy E w organizmie),
- zaburzenia wchłaniania tłuszczów,
- uczulenie na orzeszki ziemne lub soję.

Przeciwwskazania - Vitaminum A+E Gsk, 2500+50 jm, kapsułki, 30 szt.

Podczas stosowania zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nie zgłaszano.

U niektórych osób w trakcie stosowania leku VITAMINUM A+E GSK mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Uwagi

Stosowanie leku VITAMINUM A+E GSK w ciąży powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą lekarza

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Cholestyramina, kolestypol, oleje mineralne lub neomycyna stosowane doustnie mogą zmniejszać wchłanianie witamina A i E. Retinoidy mogą nasilać działanie witaminy A. Witamina E lub jej metabolity, mogą wykazywać działanie antagonistyczne w witaminą K, dlatego u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny może wystąpić ryzyko krwotoków. Witamina E może zwiększać wchłanianie i wykorzystywanie witaminy A w organizmie, a także chronić przed hiperwitaminozą A. Siarczan żelaza osłabia działanie witaminy E.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C. Chronić od światła i wilgoci. Nie zamrażać.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.