

Vitaminum B12 WZF 1000 µg 5 ampułek

Nasza cena: 3,48 zł

Opis słownikowy

Dawka	1000MCG
Opakowanie	*5
Postać	AMP.
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	CYANOCOBALAMINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania do stosowania Vitaminum B12:

- Niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera.
- Inne niedokrwistości megaloblastyczne z niedoboru wit. B12.
- Niedobory wit. B12 z następujących powodów: całkowite wyłączenie z diety produktów pochodzenia zwierzęcego (ściśle wegetarianizm);
- zahamowanie (wrodzone lub nabyte) wydzielania czynnika wewnętrznego, umożliwiającego
- wchłanianie wit. B12 (czynnik Castle'a);
- brak czynnika Castle'a na skutek resekcji żołądka;
- przewlekłe atroficzne zapalenie błony śluzowej żołądka;
- zespoły złego wchłaniania: po resekcji jelita krętego, w przebiegu celiakii, spruce tropikalnej (psylozy), choroby Leśniowskiego – Crohna;
- kompetycyjne wykorzystywanie wit. B12 przez bakterie jelitowe (zespół ślepej pętli), lub przez pasożyty (zakażenie bruzdogłowcem szerokim).

Dawkowanie

Produkt leczniczy należy podawać głęboko podskórnie lub domięśniowo. Nie wolno podawać dożylnie.

Skład

1 ml roztworu zawiera 1000 µg/ml cyjanokobalaminy - witaminy B12.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kobalt i/lub wit. B12, lub którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu.

Działania niepożądane:

Zaburzenia serca: zastoinowa niewydolność krążenia, obrzęk płuc.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: czerwienica prawdziwa.

Zaburzenia naczyniowe: zakrzepy naczyń obwodowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd.

Zaburzenia żołądka i jelit: łagodna przemijająca biegunka, uczucie wzdęcia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból po wstrzyknięciu domięśniowym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.