


## Vitaminum B2 Teva, drażetki, 50 szt.



Nasza cena: 7,31 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	DRAŻ.
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	RIBOFLAVINUM

### Opis produktu

#### Opis

Witamina B2 w drażetkach.

#### Dawkowanie - Vitaminum B2 Teva, drażetki, 50 szt.

Profilaktycznie: Dzieci od 4 roku życia i młodzież: 3 - 6mg (1-2 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych. Dorośli: 3 - 9mg (1-3 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych.

#### Składniki - Vitaminum B2 Teva, drażetki, 50 szt.

Substancja czynna: ryboflawina 3mg Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, skrobia ziemniaczana, guma arabska, talk, kwas stearynowy, skrobia pszeniczna, żelatyna, żółcień chinolinowa (E104), wosk pszczeleli, wosk Carnauba.

#### Działania

Witamina B2 (ryboflawina) w organizmie człowieka bierze udział w przemianach węglowodanów, tłuszczów i białek, uczestniczy w wytwarzaniu energii. Warunkuje prawidłowe funkcje układu nerwowego, błon śluzowych i skóry. Niedobór witaminy B2 może być przyczyną stanu zapalnego błon śluzowych jamy ustnej, języka i warg, łojotokowego zapalenia skóry, światłowstrętu, świądu i pieczenia spojówek, stanu zapalnego rogówki, pogorszenia widzenia zmierzchowego, zahamowania wzrostu u dzieci, opóźnienia rozwoju umysłowego, bezsenności i apatii. Zapasy ryboflawiny w organizmie są bardzo małe i dlatego musi być ona regularnie dostarczana w pożywieniu albo drogą suplementacji.

#### Wskazania - Vitaminum B2 Teva, drażetki, 50 szt.

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy B2.

Pomocniczo:

- w terapii lekami moczopędnymi,
- po antybiotykoterapii,
- przed i po zabiegach chirurgicznych,

- w zaburzeniach funkcji wątroby, żołądka i jelit połączonych z uporczywymi biegunkami,
- w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcjach różnego pochodzenia, stanach zapalnych skóry, chorobach psychosomatycznych).

#### **Przeciwwskazania - Vitaminum B2 Teva, drażetki, 50 szt.**

Uczulenie na witaminę B2 lub inne składniki preparatu.

#### **Przeciwwskazania - Vitaminum B2 Teva, drażetki, 50 szt.**

Sporadycznie mogą występować nudności i wymioty oraz zmiany uczuleniowe na skórze (wysypki, swędzenie).

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**