


# Vitaminum B6 Teva, 50 mg, 50 tabletek



Nasza cena: 5,76 zł

## Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PYRIDOXINUM

## Opis produktu

### Opis

## Vitaminum B6 Teva, 50 mg, 50 tabletek

Preparat stosowany m.in. w hipowitaminozie B6.

### Dawkowanie - Vitaminum B6 Teva, 50 mg, tabletki, 50 szt.

Dorośli:  
lecniczo: zwykle 50 do 100mg 3 razy na dobę.

Dzieci:  
lecniczo: 25 do 150 mg/dobę w 2-3 dawkach podzielonych.

### Składniki - Vitaminum B6 Teva, 50 mg, tabletki, 50 szt.

1 tabletki: 50mg pirydoksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sacharozę, laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, magnezu stearynian, talk, żelatynę.

### Działania

Witamina B6 po przekształceniu w postać aktywną - fosforan pirydoksalu uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów. Wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, układu odpornościowego a także prawidłowe czynności skóry. Znosi zaburzenia nerwowo-mięśniowe związane z niedoborem w większych dawkach. Łagodzi nudności i wymioty. Ułatwia przyswajanie żelaza i magnezu.

### Wskazania - Vitaminum B6 Teva, 50 mg, tabletki, 50 szt.

Preparat stosowany w hipowitaminozie B6, akrodynii, chorobie popromiennej, niedokrwistości makro- i mikrocytarnej, leukopenii, chorobie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, dystrofii mięśniowej, zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej, paradontopatiach, łojotoku, oparzeniach słonecznych, zespole napięcia przedmiesiączkowego, przy stosowaniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych, nudności u kobiet ciężarnych, leczeniu zaburzenia wchłaniania, alkoholizmie.

#### **Przeciwwskazania - Vitaminum B6 Teva, 50 mg, tabletki, 50 szt.**

Nadwrażliwość na witaminę B6, choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora dopa-dekarboksylazy.

#### **Przeciwwskazania - Vitaminum B6 Teva, 50 mg, tabletki, 50 szt.**

Duże dawki witaminy stosowane przez długi okres czasu mogą spowodować zaburzenia snu. Przy długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne istnieje możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej. Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji alergicznych i fotouczuleniowych. Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się zespołu zależności.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**