

# Voltaren Acti Forte, 25mg, tabletki powlekane, 20 szt.

Nasza cena: 23,87 zł



## Opis słownikowy

Dawka	0,025 G
Opakowanie	*20
Postać	TABL.POWL.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DICLOFENACUM

## Opis produktu

### Opis

Voltaren Acti Forte działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, zmniejsza również gorączkę.

### Dawkowanie - Voltaren Acti Forte, 25mg, tabletki powlekane, 20 szt.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

Dawka początkowa to 1 tabletkę. Jeśli to konieczne można stosować 1 tabletkę co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletek w ciągu doby.

Tabletkę należy połknąć w całości popijając szklanką wody. Zażywać podczas lub bezpośrednio po posiłku.

Nie zaleca się stosowania leku dzieci poniżej 14 roku życia.

### Składniki - Voltaren Acti Forte, 25mg, tabletki powlekane, 20 szt.

Substancją czynną jest diklofenak potasowy.

Jedna tabletkę zawiera 25 mg diklofenaku potasowego.

Inne składniki leku to:

Rdzeń: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, magnezu stearynian.

Otoczka: sacharoza, talk, powidon, makrogol 8000, celuloza mikrokryształiczna, barwnik dispersed Red 16158 Anstead: żelaza tlenek, dwutlenek tytanu.

### Działania

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

## Wskazania - Voltaren Acti Forte, 25mg, tabletki powlekane, 20 szt.

Voltaren Acti Forte stosowany jest w przypadku:

- Bólu mięśni, bólów reumatycznych, ostrego bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowania.
- Stosowany jest również w leczeniu objawów grypy i przeziębienia (bóle, gorączka), ból gardła

## Przeciwwskazania - Voltaren Acti Forte, 25mg, tabletki powlekane, 20 szt.

Nie stosować leku Voltaren Acti Forte jeśli u pacjenta:

- stwierdzono uczulenie na którykolwiek składnik leku
- kiedykolwiek występowały reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu, zapalenia lub gorączki takich jak: diklofenak, ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy
- występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
- występuje krew w stolcu lub czarne zabarwienie stolca
- występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby
- występuje ciężka niewydolność serca
- u kobiet w trzecim trymestrze ciąży

## Przeciwwskazania - Voltaren Acti Forte, 25mg, tabletki powlekane, 20 szt.

Jak każdy lek, lek Voltaren Acti Forte może powodować działania niepożądane, chociaż me u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Czasami rzadko lub bardzo rzadko występujące działania niepożądane mogą być poważne. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

- ostre bóle żołądka, krew w stolcu, smoliste stolce, krwawe wymioty
- reakcje alergiczne obejmujące obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, często z towarzyszącą wysypką skórą Zapaść
- świszczący oddech i uczucie ciężkości w klatce piersiowej (objawy wskazujące na występowanie astmy)
- ból w klatce piersiowej (objaw zawału serca), omdlenie, wysokie ciśnienie tętnicze krwt
- nagły i ostry ból głowy, sztywność karku, trudności w mówieniu, drgawki
- zaczerwienienie skóry z pęcherzami, złuszczenie skóry, fioletowe zmiany na skórze, pęcherze na błonie śluzowej w jamie ustnej lub w obrębie oczu
- obrzęk rąk, dłoni, nóg i stóp
- jakiegokolwiek zmiany w wyglądzie lub ilości moczu
- zażółcenie skóry lub oczu
- krwawienia, siniaki, wysoka gorączka lub przedłużający się ból gardła

Przyjmowanie takich leków jak diklofenak może być związane z niewielkim zwiększeniem się ryzyka ataku serca ("zawał serca") lub udaru.

Inne działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą się pojawić są zwykle łagodne. Niektóre działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu większych dawek diklofenaku. substancji czynnej leku Voltaren Acti Forte, stosowanego długotrwałe .W przypadku ich zaobserwowania należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Często (występują rzadziej niż u 1 do 10 na 100osób stosujących lek):

- Ból brzucha, ból żołądka, biegunka, nudności, wzdęcia.
- Ból głowy, zawroty głowy.
- Zaczerwienienie skóry.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek):

- Senność.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek).

- Zaparcia, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, zaburzenia smaku.
- Mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, drżenie.
- Zamazane widzenie, dzwonienie w uszach, kołatanie serca.

- Zmiany nastroju, trudności w zasypianiu, uczucie dezorientacji.

W przypadku pojawienia się działań niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce należy zaprzestać stosowania leku Voltaren Acti Forte i poinformować lekarza.

## Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**