

Voltaren Acti, tabletki, 10 szt.



Nasza cena: 10,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	Novartis Consumer Health Sa
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w przypadku bólu o słabym i umiarkowanym nasileniu.

Dawkowanie - Voltaren Acti, tabletki, 10 szt.

Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: początkowo 2 tabletki, a następnie, w razie potrzeby powtórzyć 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 75 mg (6 tabletek) w ciągu doby. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy stosować dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki.

Składniki - Voltaren Acti, tabletki, 10 szt.

Diklofenak potasowy 12,5 mg oraz substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian,

Działania

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne

Wskazania - Voltaren Acti, tabletki, 10 szt.

Preparat stosowany w przypadku bólu mięśni, bólów reumatycznych, bólu głowy, bólu zęba, w objawowym leczeniu bolesnego miesiączkowania., w objawach grypy i przeziębienia (ból i gorączka).

Przeciwwskazania - Voltaren Acti, tabletki, 10 szt.

Nie należy stosować w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek, wątroby lub serca; w przypadku ciąży lub karmienia piersią; uczulenia na diklofenak lub inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub uczulenia na którykolwiek składnik leku.

Przeciwwskazania - Voltaren Acti, tabletki, 10 szt.

Często dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, kurczowe bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, brak łaknienia), ból i zawroty głowy, senność, wysypka skórna, obrzęk obwodowy, niezbyt często krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty, smoliste stolce, krwawa biegunka), owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, pokrzywka, obrzęki, zapalenie wątroby z towarzyszącą żółtaczką lub bez żółtaczki, astma oskrzelowa, uogólnione reakcje anafilaktyczne. Pacjenci, u których po zastosowaniu diklofenaku występują zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego nie powinni w trakcie trwania kuracji prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Uwagi

Stosowanie leku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.