

# Vratizolin, krem 3g

Nasza cena: 30,06 zł



## Opis słownikowy

Dawka	3%
Opakowanie	3g
Postać	KREM
Producent	JELFA S.A. JELENIA GÓRA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DENOTIVIRUM

## Opis produktu

### Opis

Lek Vratizolin ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną denotywir o działaniu przeciwwirusowym.

### Dawkowanie - Vratizolin

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu leku należy umyć ręce, aby nie dopuścić do przeniesienia zakażenia na inne partie skóry.

Leczenie opryszczki należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych objawów, np. swędzenia i pieczenia.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zmianę opryszczkową należy smarować kilka razy na dobę niewielką ilością kremu. Leczenie trwa zwykle około 5 dni.

U osób zakażonych wirusem mogą wystąpić nawroty choroby-wówczas jest konieczne natychmiastowe zastosowanie leku Vratizolin w celu zapobieżenia tworzenia się pęcherzyków.

### Składniki - Vratizolin

1 g leku zawiera 30 mg denotywiru.

Inne składniki leku to alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina biała, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

### Działania

Denotywir jest substancją o działaniu przeciwwirusowym.

### Wskazania - Vratizolin

Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex).

## Przeciwwskazania - Vratizolin

Nie stosować leku Vratizolin, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na denotywir lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku na błony śluzowe np. ust lub oczu. Nie wolno stosować leku w leczeniu opryszczki narządów płciowych.

## Przeciwwskazania - Vratizolin

Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, reakcje miejscowe, jak podrażnienia skóry w miejscu zastosowania leku, kontaktowe zapalenie skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórą, ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry, a ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoianu i propylu parahydroksybenzoianu, lek może powodować reakcje alergiczne.

## Uwagi

Nie zaleca się stosowania leku Vratizolin u kobiet w ciąży, ze względu na brak danych dotyczących wpływu leku na przebieg ciąży. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo czy denotywir przenika do mleka matki. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

## Producent

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA  
Ul. Wincentego Pola 21  
58-500 Jelenia Góra

## Podmiot odpowiedzialny

Bausch Health Ireland Limited  
3013 Lake Drive  
Citywest Business Campus  
Dublin 24, D24PPT  
Irlandia

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

## Galeria



### LECZENIE OPRYSZCZKI WARG I TWARZY

Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/15g Krem. Skład substancji (aktywny): 1 g kremu zawiera 30 mg denotywiru (Denotywir). **Przeciwwskazania:** uczulenie na denotywir lub którykolwiek z pozostałych składników leku. **Podmiot odpowiedzialny:** Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

### Leczenie opryszczki warg i twarzy

**DO STOSOWANIA MIEJSCOWO NA SKÓRĘ\***

**SKRACA CZAS TRWANIA CHOROBY\*\***



\*Zastosowanie w okresie prodromalnym. \*\*Wzrost czasu trwania choroby.

Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/15g Krem. Skład substancji (aktywny): 1 g kremu zawiera 30 mg denotywiru (Denotywir). **Przeciwwskazania:** uczulenie na denotywir lub którykolwiek z pozostałych składników leku. **Podmiot odpowiedzialny:** Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Vratizolin stosuje się w leczeniu opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex). Zawiera substancję przeciwwirusową – denotywir, który w postaci kremu przenika do chorobowo zmienionych warstw skóry.

- Lek przeciwwirusowy bez recepty do stosowania miejscowo na skórę.
- Skracza czas trwania choroby.
- Zastosowany we wczesnym etapie (okresie prodromalnym) może zapobiec rozwojowi opryszczki (nie zapobiega nawrotom opryszczki).

Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/15g Krem. Skład substancji (aktywny): 1 g kremu zawiera 30 mg denotywiru (Denotywir). **Przeciwwskazania:** uczulenie na denotywir lub którykolwiek z pozostałych składników leku. **Podmiot odpowiedzialny:** Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

### Dla kogo lek Vratizolin

**Dla osób u których pojawiły się pierwsze objawy opryszczki, np.: swędzenia i pieczenia.**



Nazwa produktu leczniczego: Vratizolin, 30 mg/15g Krem. Skład substancji (aktywny): 1 g kremu zawiera 30 mg denotywiru (Denotywir). **Przeciwwskazania:** uczulenie na denotywir lub którykolwiek z pozostałych składników leku. **Podmiot odpowiedzialny:** Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.