

Woda utleniona Peroxygel 3.0%, żel, 15 g

Nasza cena: 9,10 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	15 g
Postać	ZEL
Producent	GEMI P.P.F. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HYDROGENII PEROXIDUM

Opis produktu

Opis

Peroxygel 3,0 to specjalna postać wody utlenionej w żelu, zapobiegająca spływaniu leku z miejsca zastosowania, dzięki wytworzonemu na powierzchni rany delikatnemu opatrunkowi błonowemu. Lek zawiera jako substancję czynną nadtlenek wodoru w stężeniu 3%.

Dawkowanie - Woda utleniona Peroxygel 3.0%, żel, 15 g

Nałożyć 0,5-1 cm żelu bezpośrednio na ranę, otarcie lub zadrapanie. Po wyschnięciu tworzy warstwę ochronną w postaci delikatnego opatrunku błonowego. Preparat ma właściwości termoodwracalne. W temperaturze poniżej 20°C i powyżej 45°C jest cieczą. Po zastosowaniu na skórę przybiera postać żelu.

Składniki - Woda tleniona Peroxygel 3.0%, żel, 15 g

Substancja czynna: 100 g preparatu zawiera 10 g wodoru nadtlenu 30%. Substancje pomocnicze: edetynian disodu, poloksamer 407, etanol 96%, kwas fosforowy, stężony, woda oczyszczona.

Działania

Nadtlenek wodoru pod wpływem enzymów znajdujących się w tkankach i wielu bakteriach, rozpada się na wodę i aktywny tlen atomowy. Reakcja ta następuje szybko w obecności miedzi i innych krwi. Wydzielający się tlen tworzy pianę i usuwa drobnoustroje z miejsca odkażanego, niszczy komórki krwi wypływającej z rany, a także komórki odsłonięte wskutek uszkodzenia skóry, oczyszcza mechanicznie za szczątków uszkodzonej tkanki.

Żel działa bakteriobójczo w ciągu 1 minuty na bakterie Gram dodatnie i Gram ujemne. Peroxygel 3,0 działa również grzybobójczo na drożdżaki chorobotwórcze, szczególnie *Candida albicans* oraz grzyby.

Wskazania - Woda tleniona Peroxygel 3.0%, żel, 15 g

Do odkażania ran, otarć i zadrapań skóry.

Przeciwwskazania - Woda tleniona Peroxygel 3.0%, żel, 15 g

Nie należy stosować u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przeciwwskazania - Woda tleniona Peroxygel 3.0%, żel, 15 g

W miejscu zastosowania może wystąpić krótkie, przemijające pieczenie. Mogą wystąpić reakcje alergiczne u osób nadwrażliwych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.