

# Xanax 0,25 mg, 30 tabletek

Nasza cena: 18,24 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,25MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	UPJOHN EESV HOLANDIA [NL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ALPRAZOLAMUM

## Opis produktu

### Opis

## Xanax 0,25 mg, 30 tabletek

Lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny.

### Działanie

- nasenne
- przeciwlękowe
- przeciwdrgawkowe
- uspokajające
- zmniejsza napięcie mięśni

### Wskazania do stosowania

Lek jest wskazany do stosowania w krótkotrwałym leczeniu stanów lękowych oraz zespołów lękowo-depresyjnych:

- zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez niej
- zespołu lęku uogólnionego
- zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju

Zaleca się stosowanie preparatu jedynie w tych przypadkach, kiedy objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

### Co zawiera i jak działa Xanax - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest **alprazolam**. **Alprazolam** jest pochodną **benzodiazepiny** o czasie działania krótkim do średniego.

Wywiera, zależne od dawki, działanie hamujące na wszystkich poziomach ośrodkowego układu nerwowego, począwszy od niewielkiego uspokojenia, poprzez sen, aż do śpiączki.

Pobudza oraz ułatwia działanie hamujące kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który jest głównym inhibitorem przewodnictwa nerwowego w mózgu i odpowiada za hamowanie pre- i post-synaptyczne we wszystkich częściach ośrodkowego układu nerwowego.

W porównaniu do innych benzodiazepin, alprazolam wywiera silniejsze działanie anksjolityczne i przeciwlękowe, przy zachowaniu działania zmniejszającego napięcie mięśniowe, przeciwdrgawkowe oraz uspokajająco-nasenne.

## Dawkowanie

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Próbę odstawienia leku lub zmniejszenia dawki należy przeprowadzać stopniowo, pod ścisłą kontrolą lekarską. Przekraczanie dawek terapeutycznych nie zwiększa skuteczności leczenia, może natomiast nasilać działania niepożądane.

Leczenie powinno trwać tak krótko, jak to możliwe.

Uwaga! W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu.

**Leku nie stosuje się u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.**

## Przeciwwskazania

Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne benzodiazepiny.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:

- nużliwość mięśni (*myasthenia gravis*)
- ciężka niewydolność oddechowa
- zespół bezdechu sennego
- ciężka niewydolność wątroby

**Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.**

## Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwość na alprazolam, inne benzodiazepiny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, miastenię, jaskrę z wąskim kątem przesączania, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, bezdech senny, zaburzenia funkcji wątroby. Gdy przyjmujesz leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe, neuroleptyki, nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe, digoksynę, preparaty litu, cymetydynę, etynyloestradiol, ketokonazol, itraconazol. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. **Leku nie stosuje się w ciąży. Leczenie należy zakończyć odpowiednio wcześniej przed planowaną ciążą. Pochodne benzodiazepiny przenikają do pokarmu kobiecego. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.**

## Możliwe skutki uboczne

Bardzo często mogą wystąpić: uspokojenie, senność.

Często mogą wystąpić: zmniejszenie apetytu, stan splątania, dezorientacja, depresja, zmniejszenie libido, ataksja, zaburzenia równowagi, nieprawidłowa koordynacja, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna potrzeba snu, letarg, zawroty głowy, ból głowy, uczucie pustki w głowie, nieostre widzenie, zaparcia, suchość w jamie ustnej, nudności, zmęczenie, drażliwość.

Niezbyt często mogą wystąpić: niepokój, bezsenność, nerwowość, niepamięć, drżenie, objawy wegetatywne, osłabienie siły mięśniowej, zmiana masy ciała, hiperprolaktynemia (zwiększone stężenie prolaktyny we krwi), hipomania, mania, halucynacje, gniew, agresywne zachowanie, wrogie zachowanie, pobudzenie, zaburzenia libido, nieprawidłowe myślenie, zwiększone pobudzenie psychoruchowe, dystonia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie wątroby, czynnościowe zaburzenia pracy wątroby, żółtaczką, zapalenie skóry,

nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, zaburzenia czynności płciowych, nieregularne miesiączkowanie ginekomastia, zwiększone ciśnienie wewnętrzne.

Rzadko może wstąpić cholestaza.

Ponadto, z nieznaną częstością, może wystąpić zachwianie równowagi układu autoimmunologicznego.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.